



Makrogol oralt

(Forlax Junior)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Pulver till oral lösning i dospåse 4 g (Forlax Junior).
Forlax dospåse innehåller 10 g, dvs ca dubbla innehållet, se annan instruktion.

Beredningsinstruktion:

Innehållet i en dospåse ska lösas i ett kvarts glas vatten (ca 0,5 dl) precis innan intag.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt

Enteralt i sond

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Forlax Junior (registrerad produkt)

1 st, Pulver till oral lösning, dospåse

HÅLLBAR: Inga särskilda förvaringsanvisningar.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Obstipation

Doseringen avser dospåse Forlax JUNIOR, 4 g

Till barn under 2 år rekommenderas i första hand behandling med laktulos.

Barn 6 mån - 1 år: 1 dospåse per dag

Barn 1 - 6 år: 1 dospåse per dag, kan ökas successivt till 5 dospåsar per dag

Barn 7 - 11 år: 2 dospåsar per dag, kan ökas successivt till 5 - 8 dospåsar per dag

Barn över 12 år: Dosering som för vuxna, 2 - 4 dospåsar per dag

Vid dosering av mer än 1 dospåse per dag kan dosen delas upp på två dostillfällen (morgon och kväll).

Behandlingen bör omprövas var 3:e månad.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Rekommenderade läkemedel för barn - bakgrundsmaterial.

Läkemedelskommittéerna i Uppsala - Örebroregionen (7 landsting)

https://regionvastmanland.se/globalassets/vardgivare-och-samarbetspartners/lakemedel/baslakemedel/reklista-barn-2017-18_e.pdf

Internetadress Rikshandboken Barnhälsovård - Förstoppning

<https://www.rikshandboken-bhv.se/pediatrik/buk/forstoppning/>

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2019-01-16

ePedID: 4696

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-01-16

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-01-16

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT