



Makrogol oralt

(ex Forlax)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Pulver till oral lösning i dospåse 10 g, ex Forlax, Omnilax

Beredningsinstruktion:

Varje dospåse ska lösas i ett glas vatten precis innan intag.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt

Enteralt i sond

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Obstipation

1 - 2 dospåsar per dag.

Dosen kan variera från en dospåse varannan dag (särskilt hos barn) till 2 dospåsar per dag.

Dosen ska helst tas som en engångsdos på morgonen.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2018-04-18

ePedID: 4697

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-04-20

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-04-20

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT