



Fenobarbital intravenös inf/inj 200 mg/mL

(Fenemal)

Kontrollera blodtryck och andning, risk för hypotension och andningsdepression.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Ospädd injektionslösning Fenemal Meda 200 mg/mL

ARBETSMILJÖ

Allergirisk, hantera enligt lokal rutin, Stänk på huden kan ge rodnad och irritation. Långvarig eller upprepad kontakt kan i sällsynta fall ge upphov till allergiska reaktioner.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Ska ges i separat kateter pga risk för fällning.

Nyfödda, laddningsdos:

Ges vanligen som injektion under ca 5 min.

I litteraturen anges dock max 1 mg/kg/min, vilket ger längre administreringstid. Ges då lämpligen som infusion under 20 - 30 min.

Nyfödda, underhållsdos:

Ges som injektion under 3 - 5 min.

Barn, laddningsdos:

Ges vanligen som injektion under ca 15 min. I litteraturen anges 1 - 2 mg/kg/min. Vid längre administreringstid än 15 min ges dosen lämpligen som infusion.

Barn, underhållsdos:

Ges som injektion under 3 - 5 min.

Kan ge vävnadsskada vid extravasering pga högt pH.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Fortsatt/upprepad behandling styrs utifrån koncentrationsbestämning, klinisk effekt och eventuella biverkningar.

Anfall hos nyfödda

Laddningsdos:

(10 -) 15 - 20 mg/kg. Dosen kan vid behov upprepas upp till max 40 mg/kg under första dygnet.

Underhållsdos:

1,5 - 2,5 mg/kg x 2 alt. 3 - 5 mg/kg x 1. Påbörjas 12 - 24 timmar efter laddningsdosen.

Status epileptikus (SE) hos:

- barn yngre än 2 år
- alla barn med icke-konvulsivt SE
- alla barn som står på peroral fenytoinbehandling

Laddningsdos:

(10 -) 15 - 20 mg/kg, max 1 g. Dosen kan vid behov upprepas till max 40 mg/kg under första dygnet, max 2 g.

Om patienten står på peroral fenobarbitalbehandling: 5 mg/kg

Om god effekt av laddningsdosen och indikation för förlängd akutbehandling startas underhållsbehandling efter 12 timmar.

Underhållsdos:

2,5 mg/kg x 2 alt. 5 mg/kg x 1

RIMLIG DOS FÖR 200 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
2,5 mg/kg	-	-	0,12 mL	0,62 mL
15 mg/kg	-	0,38 mL	0,75 mL	3,75 mL
20 mg/kg	0,1 mL	0,5 mL	1 mL	5 mL



Fenobarbital intravenös inf/inj 200 mg/mL

(Fenemal)

ÖVRIG INFORMATION

Riktvärde för plasmakoncentrationen fenobarbital vanligen 45 - 130 mikromol/L.

Fenobarbital är en potent inducerare av flera CYP-enzymer bl.a. CYP3A4 vilket medför risk för interaktion med många andra läkemedel.

Fenemal injektionslösning innehåller etanol motsvarande ca 3,8 mL starköl (5%) per mL ospädd injektionslösning.

Fenemal injektionslösning innehåller även propylenglykol 400 mg/mL ospädd injektionslösning. Detta motsvarar 5 mg/kg propylenglykol vid en dos av fenobarbital på 2,5 mg/kg.

Den Europeiska läkemedelsmyndigheten anger följande gränsvärden (maximal daglig dos som hjälpmne i läkemedel) för propylenglykol:

Nyfödda upp till 28 dagar: 1 mg/kg

Prematurt nyfödda upp till 44 veckor postmenstruell ålder: 1 mg/kg

Barn 1 mån - 4 år: 50 mg/kg

Barn 5 - 18 år: 500 mg/kg

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Fenemal (registerad produkt)

200 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i kylskåp i originalförpackningen, ljuskänsligt. Sparas ej efter första uttag.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Internetadress American Epilepsy Society, Algorithm for convulsive status epilepticus in children and adults

https://www.aesnet.org/sites/default/files/file_attach/PressReleases/2016/CSE%20Treatment%20chart-final_rerelease%20%28282%29.jpg

Micromedex

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunit.org/eped_extra/lokalreferens.html#4708

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2018-05-14

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-05-15

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

ePedID: 4708

Versionsnummer, major: 1

Giltig fr o m: 2018-05-15

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT