



Naloxon oralt 1 mg/mL

(Extempore) oral lösning

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt

Enteralt i sond

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Naloxon APL (extempore - ej lagervara)

1 mg/mL, Oral lösning

HÅLLBAR: För infektionskänslig patient hållbar 1 mån efter första uttag, annars se utgångsdatum

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Opioidinducerad förstoppning

Startdos 2 - 3 (- 4) mikrog/kg x 4

Dosen kan dubblas varannan dag till 15 mikrog/kg och dos. Det finns vid enskilda tillfällen behov av högre doser.

Överväg andra läkemedel som Relistor eller Moventig till patienter som inte har tillräcklig effekt av naloxonmixtur.

RIMLIG DOS FÖR 1 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
2 mikrog/kg	-	-	-	0,1 mL
4 mikrog/kg	-	-	-	0,2 mL
15 mikrog/kg	-	-	0,15 mL	0,75 mL

REFERENS/LÄNK

Internetadress APL, Apotekens Produktion och Laboratorier

<http://www.apl.se>

Internetadress Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser>

Internetadress Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård: Riktlinjer för smärtbehandling hos barn-akut och postoperativ smärta

<https://sfai.se/riktlinje/medicinska-rad-och-riktlinjer/anestesi/smartlindring-av-barn/>

Rekommendation (Grade 2D)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4716

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2018-05-25

ePedID: 4716

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-05-25

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-05-25

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT