



Oximetazolin nasalt 0,5 mg/mL

(Nezeril) näsdroppar

ADMINISTRERINGSSÄTT

Nasalt: Innan användning av näsdropparna bör barnet snyta ur näsan. Efter att näsdropparna har administrerats i vardera näsborren bör barnet sniffa in luft ett par gånger för att sprida läkemedlet i näslemhinnan.

ÖVRIG INFORMATION

Använd inte oximetazolin mer än 10 dagar i följd, kan ge läkemedelsrelaterad rinit.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Nezeril (registrerad produkt)

0,5 mg/mL, Näsdroppar, lösning

HÅLLBAR: Endosbehållare i öppnad innerkuvert är hållbara i 3 månader. Förvara de oöppnade endosbehållarna i sitt innerkuvert.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Rinit samt avsvällande vid sinuit

Barn från 10 - 18 år:

1 endosbehållare töms i vardera näsborren 2 - 3 gånger/dygn

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2018-08-30

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-09-06

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

ePedID: 4717

Versionsnummer, major: 1

Giltig fr o m: 2018-09-06

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT