



Oximetazolin nasalt 0,25 mg/mL

(ex Nezeril) näsdroppar/nässpray

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

- Alt. 1: Näsdroppar, endosbehållare 0,25 mg/mL, 0,1 mL (Nezeril)
 Nässpray, lösning 0,25 mg/mL (ex Nezeril)
 Alt. 2: Spädning av endosbehållare 0,5 mg/mL (Nezeril, vid rest av endosbehållare och nässpray 0,25 mg/mL)
 Alt. 3: Spädning av nässpray 0,5 mg/mL (ex Nezeril, vid rest av endosbehållare 0,5 mg/mL).

För yngre barn finns licenspreparat 0,1 mg/mL eller så kan spädning ske från övriga koncentrationer, se annan instruktion.

INGEN SPÄDNING

Alt. 1

NÄSSPRAY/DRP
0,25 mg/mL
 1 st

EN-STEGSSPÄDNING

Alt. 2 Spädning av endosbehållare 0,5 mg/mL

Oximetazolin		NaCl 9 mg/mL		NÄSDR LÖ END
0,5 mg/mL				0,25 mg/mL
	+		=	
0,1 mL		0,1 mL		0,2 mL

Beredningsinstruktion:

Tillsätt 0,1 mL NaCl 9 mg/mL direkt i endosbehållaren alternativt töm endosbehållarens innehåll (0,1 mL) i en medicinkopp, tillsätt 0,1 mL mängd NaCl 9 mg/mL och sug sedan upp blandningen i den tomma endospipetten och administrera från den.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Avsvällande vid nästäppa

Barn 2 - 6 år:
 2 droppar eller 1 sprayning i vardera näsborren x 2 - 3

Barn 7 - 10 år:
 0,1 mL eller 2 sprayningar i vardera näsborren x 2 - 3

Används högst 10 dagar i rad, kan annars ge läkemedelsrelaterad nästäppa.

ÖVRIG INFORMATION

Nasin nässpray innehåller konserveringsmedel som kan verka irriterande på näslemhinnan.

Till yngre barn eller vid kvarstående besvär efter 10 dagar kan koksaltlösning användas.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress FDA - Biverkningsrapport

<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm325257.htm>

Internetadress MHRA - Overview, Risk: benefit of OTC cough and cold medicines in children

<http://www.mhra.gov.uk/home/groups/pl-p/documents/websiteresources/con041374.pdf>

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRAL

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 4718

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2023-07-06

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT





Oximetazolin nasalt 0,25 mg/mL

(ex Nezeril) näsdroppar/nässpray

EN-STEGSSPÄDNING

Alt. 3 Spädning av nässpray 0,5 mg/mL

Oximetazolin	NaCl 9 mg/mL	NÄSDR LÖ END
0,5 mg/mL	+	= 0,25 mg/mL
0,1 mL	0,1 mL	0,2 mL

Beredningsinstruktion:

Tillsätt 0,1 mL oximetazolin 0,5 mg/mL till en 1-mL spruta med kork genom att spraya ner i sprutan (spraya några gånger i luften innan för att fylla röret i nässprayflaskan för att kunna vinkla sprayen och lättare spraya in i sprutan).

Addera 0,1 mL NaCl 9 mg/mL till 1-mL sprutan innehållandes 0,1 mL oximetazolin.

OBS! Det kan vara svårt att få exakt volym av nässprayen ned i sprutan.

ADMINISTRERING

Nasalt:

Innan användning av näsdropparna bör barnets näsa rengöras från snor. Efter att näsdropparna har administrerats i vardera näsborren bör barnet, om möjligt, sniffa in luft ett par gånger för att sprida läkemedlet i nässlemhinnan.

Vid användning av nässpray (flaska) ska sprayflaskan laddas innan första användning genom att hålla flaskan i upprätt läge och spraya några gånger i luften. Kan behöva upprepas om flaskan inte använts under längre tid.

Vid egen spädning av näsdroppar i endosbehållaren (alt. 2) administreras en halv pipett av färdigspädd lösning (0,1 mL).





Oximetazolin nasalt 0,25 mg/mL

(ex Nezeril) näsdroppar/nässpray

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Oximetazolin (registrerad produkt)

0,5 mg/mL, Näsdroppar, lösning, endosbehållare

Öppnade endosbehållare ska förvaras i sitt innerkuvert i rumstemperatur.

Endosbehållare i öppnat innerkuvert är hållbara 3 månader. Öppnad endosbehållare sparas inte.

0,5 mg/mL, Nässpray, lösning

Förvaras i rumstemperatur med skyddshuven påsatt. Vid användning för spädning: hållbar enligt utgångsdatum på förpackningen.

0,25 mg/mL, Näsdroppar, lösning, endosbehållare

Öppnade endosbehållare ska förvaras i sitt innerkuvert i rumstemperatur.

Endosbehållare i öppnat innerkuvert är hållbara 3 månader. Öppnad endosbehållare sparas inte.

0,25 mg/mL, Nässpray, lösning

Förvaras i rumstemperatur med skyddshuven påsatt. Använd en flaska per patient. Hållbarhet enligt utgångsdatum på förpackningen.