



Oximetazolin nasalt 0,25 mg/mL

(Nezeril) näsdroppar

ADMINISTRERINGSSÄTT

Nasalt: Innan användning av näsdropparna bör barnet snyta ur näsan om möjligt. Efter att näsdropparna har administrerats i vardera näsborren bör barnet sniffa in luft ett par gånger för att sprida läkemedlet i nässlemhinnan.

ÖVRIG INFORMATION

Använd inte oximetazolin mer än 10 dagar i följd, kan ge läkemedelsrelaterad rinit.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Nezeril (registrerad produkt)

0,25 mg/mL, Näsdroppar, lösning

HÅLLBAR: Endosbehållare i öppnad innerkuvert är hållbara i 3 månader. Förvara de öppnade endosbehållarna i sitt innerkuvert.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Rinit samt avsvällande vid sinuit

Nyfödda (i undantagsfall):

1 droppe i vardera näsborren 3 - 4 gånger/dygn

Barn 1 mån - 2 år:

1 droppe i vardera näsborren 3 - 4 gånger/dygn

Barn över 2 - 6 år:

2 droppar i vardera näsborren 2 - 3 gånger/dygn

Barn över 6 - 10 år:

1 endosbehållare töms i vardera näsborren 2 - 3 gånger/dygn

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4718

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2018-08-28

ePedID: 4718

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-09-06

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-09-06

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT