



# Oximetazolin nasalt 0,25 mg/mL

(ex Nezeril) näsdroppar/nässpray

## Spädning från olika utgångskoncentrationer.

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

- Alt. 1: Näsdroppar, endosbehållare 0,25 mg/mL, 0,1 mL (Nezeril)  
 Nässpray, lösning 0,25 mg/mL (ex Nezeril)  
 Alt. 2: Spädning av Nezeril endosbehållare 0,5 mg/mL (Vid rest av endosbehållare och nässpray 0,25 mg/mL)  
 Alt. 3: Spädning av Nezeril nässpray 0,5 mg/mL (vid rest av endosbehållare 0,5 mg/mL).

För yngre barn finns licenspreparat 0,1 mg/mL eller så kan spädning ske från övriga koncentrationer, se annan instruktion.

### INGEN SPÄDNING

#### Alt. 1

NÄSSPRAY/DRP  
**0,25 mg/mL**  
 1 st

### EN-STEGSSPÄDNING

#### Alt. 2 Spädning av endosbehållare 0,5 mg/mL

Oximetazolin		NaCl 9 mg/mL		NÄSDR LÖ END
0,5 mg/mL				<b>0,25 mg/mL</b>
0,1 mL	+	0,1 mL	=	0,2 mL

#### Beredningsinstruktion:

Tillsätt 0,1 mL NaCl 9 mg/mL direkt i endosbehållaren med Nezeril 0,5 mg/mL alternativt töm endosbehållarens innehåll (0,1 mL) i en medicinkopp, tillsätt 0,1 mL mängd NaCl 9 mg/mL och sug sedan upp blandningen i den tomma endospipetten och administrera från den.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Avsvällande vid nästäppa

Barn 2 - 6 år:  
2 droppar eller 1 sprayning i vardera näsborren x 2 - 3

Barn 7 - 10 år:  
0,1 mL eller 2 sprayningar i vardera näsborren x 2 - 3

Används högst 10 dagar i rad, kan annars ge läkemedelsrelaterad nästäppa.

### ÖVRIG INFORMATION

Nasin nässpray innehåller konserveringsmedel som kan verka irriterande på nässlemhinnan.

Till yngre barn eller vid kvarstående besvär efter 10 dagar kan koksaltlösning användas.

### REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress FDA - Biverkningsrapport

<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm325257.htm>

Internetadress MHRA - Overview, Risk: benefit of OTC cough and cold medicines in children

<http://www.mhra.gov.uk/home/groups/pl-p/documents/websiteresources/con041374.pdf>

Rekommendation , (Grade 2C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 4718

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2023-06-27

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**





## Oximetazolin nasalt 0,25 mg/mL

(ex Nezeril) näsdroppar/nässpray

### EN-STEGSSPÄDNING

#### Alt. 3 Spädning av nässpray 0,5 mg/mL

Oximetazolin	NaCl 9 mg/mL		NÄSDR LÖ END
0,5 mg/mL		+	= <b>0,25 mg/mL</b>
0,1 mL	0,1 mL		0,2 mL

#### Beredningsinstruktion:

Tillsätt 0,1 mL oximetazolin 0,5 mg/mL till en 1-mL spruta med kork från Nezeril nässpray genom att spraya ner i sprutan (spraya några gånger i luften innan för att fylla röret i Nezerilflaskan för att kunna vinkla sprayen och lättare spraya in i sprutan).

Addera 0,1 mL NaCl 9 mg/mL till 1-mL sprutan innehållandes 0,1 mL oximetazolin.

OBS! Det kan vara svårt att få exakt volym av nässprayen ned i sprutan.

### ADMINISTRERING

Nasalt:

Innan användning av näsdropparna bör barnets näsa rengöras från snor. Efter att näsdropparna har administrerats i vardera näsborren bör barnet, om möjligt, sniffa in luft ett par gånger för att sprida läkemedlet i näslemhinnan.

Vid användning av nässpray (flaska) ska sprayflaskan laddas innan första användning genom att hålla flaskan i upprätt läge och spraya några gånger i luften. Kan behöva upprepas om flaskan inte använts under längre tid.

Vid egen spädning av näsdroppar i endosbehållaren (alt. 2) administreras en halv pipett av färdigspädd lösning (0,1 mL).





## Oximetazolin nasalt 0,25 mg/mL

(ex Nezeril) näsdroppar/nässpray

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Oximetazolin (registrerad produkt)

0,5 mg/mL, Näsdroppar, lösning, endosbehållare

Oöppnade endosbehållare ska förvaras i sitt innerkuvert i rumstemperatur.

Endosbehållare i öppnat innerkuvert är hållbara 3 månader. Öppnad endosbehållare sparas inte.

0,5 mg/mL, Nässpray, lösning

Förvaras i rumstemperatur med skyddshuven påsatt. Vid användning för spädning: hållbar enligt utgångsdatum på förpackningen.

0,25 mg/mL, Näsdroppar, lösning, endosbehållare

Oöppnade endosbehållare ska förvaras i sitt innerkuvert i rumstemperatur.

Endosbehållare i öppnat innerkuvert är hållbara 3 månader. Öppnad endosbehållare sparas inte.

0,25 mg/mL, Nässpray, lösning

Förvaras i rumstemperatur med skyddshuven påsatt. Använd en flaska per patient. Hållbarhet enligt utgångsdatum på förpackningen.