



Metylfenidat oralt

(ex Concerta) tabletter/kapslar

Narkotikaklassat. Starkt beroendeframkallande.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Depottabletter (ex Concerta)
Kortverkande tabletter (ex Medikinet) och
Kapslar med modifierad frisättning (ex Ritalin)

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: Tas på morgonen samt ev. vid lunch

ÖVRIG INFORMATION

Läkemedelsbehandling behöver kompletteras med psykosociala och pedagogiska insatser för barnet.

Innan insättning ska en noggrann medicinsk bedömning göras.

Modifierad frisättning innebär både snabb och långsam frisättning.

Kortverkande tabletter kan vara ett alternativ vid biverkningar i form av dysfori, sömnstörning eller nedsatt aptit.

Blodtryck, puls, tillväxt, aptit samt ny eller förvärrad psykisk störning ska bevakas regelbundet, minst var 6:e månad.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Metylfenidat (ex Concerta) (registrerad produkt)

1 st, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25°C. Vissa tillverkare anger att tabletterna är fuktkänsliga. Gäller för styrkorna 5, 10 och 20 mg (ex Medikinet)

1 st, Depottablett

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25°C. Vissa tillverkare anger att depottabletterna är fuktkänsliga. Gäller för styrkorna 18, 27, 36 och 54 mg (ex Concerta)

1 st, Kapsel med modifierad frisättning, hård

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25°C. Vissa tillverkare anger att kapslarna är fuktkänsliga. Gäller för styrkorna 5, 10, 20, 30, 40, 50 och 60 mg (ex Ritalin)

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Medelsvår/svår ADHD

Barn från 6 år
Startdos (kortverkande tablett): 5 mg x 1 - 2, ges på morgonen och ev. vid lunch.
Dosering 5 mg x 2 (kortverkande tablett) kan ersättas med 10 mg x 1 på morgonen (kapsel med modifierad frisättning).

Därefter individuell dositering med 5 - 10 mg/vecka.

Underhållsdos: 0,5 - 2 mg/kg, max 60 mg/dygn (Concerta max 54 mg/dygn).

Effekt bör ses efter 4, 8 eller 12 timmar beroende på beredningsform.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Läkemedelsverket - Behandlingsrekommendationer, Läkemedel vid adhd
lv.se/adhd

Internetadress Svenska Barnläkarföreningen, Svenska Föreningen för barn- och ungdomspsykiatri - Riktlinje ADHD 2016

<http://www.sfbup.se/wp-content/uploads/2016/11/SFBUPRiktlinjer-adhd.pdf>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2018-05-23

ePedID: 4720

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2018-08-22

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-08-22

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT