



## Metylfenidat oralt

(ex Concerta) tabletter/kapslar

**Narkotikaklassat. Stöldbegärligt.**

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kapslar med modifierad frisättning (Equasym depot, Medikinet, Ritalin)  
Depottabletter (Concerta, Metylfenidat Actavis, Methylphenidate Mylan, Methylphenidate Sandoz)  
Kortverkande tabletter (Ritalin, Medikinet, Medanef, Methylphenidate Alternova)

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: Tas på morgonen samt ev. vid lunch

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Metylfenidat (ex Concerta) (registrerad produkt)

1 st, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25°C. Vissa tillverkare anger att tablettorna är fukt känsliga. Gäller för styrkorna 5, 10 och 20 mg (ex Medikinet)

1 st, Depottablett

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25°C. Vissa tillverkare anger att depottablettorna är fukt känsliga. Gäller för styrkorna 18, 27, 36 och 54 mg (ex Concerta)

1 st, Kapsel med modifierad frisättning, hård

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25°C. Vissa tillverkare anger att kapslarna är fukt känsliga. Gäller för styrkorna 5, 10, 20, 30, 40, 50 och 60 mg (ex Ritalin)

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

Behandling ska inledas och övervakas av läkare med specialistkompetens i barn- och ungdomspsykiatri bl.a., se Övrig information.

#### Medelsvår/svår ADHD

Barn 6 - 18 år:

Kapsel med modifierad frisättning, startdos: 5 - 20 mg x 1 (beroende på patientens vikt).

Depottablett, startdos: 18 mg x 1

Starta med låg dos och titrera mot måldos inom 2 - 3 veckor, exempelvis 5 - 10 mg/vecka. Under första året kan det behövas flera dosjusteringar.

Byte av läkemedel och/eller beredningsform kan behövas.

Beredningsformen bör ge effekt under förväntad tid (4, 8 eller 12 timmar).

Underhållsdos: 0,5 - 2 mg/kg, de flesta patienter hamnar på underhållsdosen 1 mg/kg/dygn.

Maxdos enligt FASS är 54 mg (depottabletter) respektive 60 mg (kortverkande tabletter). Man kan ofta behöva gå över rekommenderad maxdos. Detta ska motiveras i journalen.

Rekommenderas att inte skriva ut för mer än 3 månaders förbrukning per receptförskrivning. Detta för att minska risken att läkemedlet hamnar i orätta händer.





## Metylfenidat oralt

(ex Concerta) tabletter/kapslar

### ÖVRIG INFORMATION

Läkemedelsbehandling behöver kompletteras med psykosociala och pedagogiska insatser för barnet.

Under insättning ska en noggrann medicinsk bedömning göras.

Modifierad frisättning innebär både snabb och långsam frisättning.

Puls och blodtryck kontrolleras en gång per vecka under de första 4 veckorna samt vid dosjustering. Därefter ska blodtryck, puls, tillväxt, aptit samt ny eller förvärrad psykisk störning regelbundet bevakas.

Behandling ska inledas och övervakas av läkare med specialistkompetens i barn- och ungdomspsykiatri, psykiatri, rättspsykiatri, neurologi eller barn- och ungdomsneurologi med habilitering eller för läkare med specialistkompetens som fått beviljad dispens från läkemedelsverket.

### REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Svenska Föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, SFBUP - Riktlinje ADHD, 2016

<http://www.sfbup.se/vardprogram/riktlinje-adhd/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Läkemedel vid adhd

<https://lv.se/adhd>

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2019-10-22

ePedID: 4720

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-10-22

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2019-10-22

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**