



Tetrakosaktid intravenös inj 0,25 mg/mL = 250 mikrog/mL (Synacthen)

ADMINISTRERING

Anafylaxiberedskap ska finnas tillgänglig på avdelningen.

Intravenös injektion

RIMLIG DOS för Tetrakosaktid intravenös inj 0,25 mg/mL = 250 mikrog/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
36 mikrog/kg	0,14 mL	0,72 mL	-	-

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Synacthen (registrerad produkt)

250 mikrog/mL, Injektionsvätska, lösning

Förvaras i kylskåp. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Bruten ampull får inte sparas.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Evaluering av binjurebarksfunktion

För praktiskt genomförande och provtagning se lokal riktlinje.

Nyfödda: 36 mikrog/kg (ca 0,15 mL/kg)

Barn 1 - 11 mån: 125 mikrog (0,5 mL)

Barn 1 - 18 år: 250 mikrog (1 mL)

Alt. dosering (från region Skåne, region Kronoberg):

Nyfödda: 36 mikrog/kg (ca 0,15 mL/kg)

Barn 1 - 23 mån: 36 mikrog/kg (ca 0,15 mL/kg), max 250 mikrog (1 mL)

Barn 2 - 18 år: 250 mikrog (1 mL)

ÖVRIG INFORMATION

Testet är inte tillförlitligt hos patienter som använder p-pillar.

All typ av steroidbehandling, utom dexametason eller betametason, påverkar testresultatet.

REFERENS/LÄNK

Läkemedelsverket Läkemedelsfakta - Synacthen

<https://www.lakemedelsverket.se/sv/sok-lakemedelsfakta/lakemedel?id=19740614000055>

PubMed PMID Chanson P et al. Group 2: Adrenal insufficiency: screening methods and confirmation of diagnosis. Ann endocrinol 2017

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29174200>

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4721

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 4721

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2022-03-22

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT