



## Ciprofloxacin aurikulärt 2 mg/mL

(Cetraxal) örondroppar

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Örondroppar i endosbehållare 2 mg/mL, utan konserveringsmedel

### ADMINISTRERING

I yttre hörselgången:

Patienten bör ligga med det behandlade örat uppåt i minst 1 min efter appliceringen för att dropparna ska nå långt ner i hörselgången.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Ciprofloxacin (registrerad produkt)

2 mg/mL, Örondroppar, lösning

Förvaras vid högst 30 °C. Förvaras i originalförpackningen, ljuskänsligt.

Endosbehållare i öppnad påse ska användas inom 8 dagar från öppnandet.

Öppnad endosbehållare ska användas direkt, sparas ej.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Rinnande rötötit

Bör ordinerars i samråd med öronspecialist.

Ciprofloxacin kan vara indicerat då behandling med hydrokortison/oxitetracyklin/polymyxin B inte har gett önskad effekt och växt av ciprofloxacin känsliga bakterier har konstaterats.

Barn 1 - 18 år: en endosbehållare/öra som ska behandlas x 2

Behandlingstid: 7 dagar

### REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Läkemedel vid otit

[www.lakemedelsverket.se/otit](http://www.lakemedelsverket.se/otit)

Rekommendation , (Grade 2C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 4734

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2022-08-30

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**