



Flekainid oralt 5 mg/mL

oral lösning (licens)

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt

Om behov av spädning, använd sterilt vatten. Detta för att undvika fällning, något som kan ske vid spädning med natriumklorid.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Flecainide (licensprodukt)

5 mg/mL, Oral lösning

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25°C.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ventrikulär takykardi (VT) och Supraventrikulär takykardi (SVT)

Barn 1 mån - 18 år: Initialt 0,2 - 0,5 mg/kg x 3

Måldos 1 - 2 mg/kg x 3, max 8 mg/kg/dygn

Monitorera blodtryck, EKG och QTc-tid dagligen.

Monitorera även S-flekainid efter behov.

RIMLIG DOS FÖR 5 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,2 mg/kg	-	0,2 mL	0,4 mL	2 mL
2 mg/kg	-	2 mL	4 mL	20 mL

REFERENS/LÄNK

Pediatric Dosage Handbook

Summary of Product Characteristics (SPC) Flecainide Acetate 25 mg/5mL oral solution

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4736

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2018-07-03

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2018-08-08

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

ePedID: 4736

Versionsnummer, major: 1

Giltig fr o m: 2018-08-08

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT