



Flekainid oralt 5 mg/mL

(Licens) oral lösning

INGEN SPÄDNING

ORAL LÖSN
5 mg/mL
 300 mL

Beredningsinstruktion:

Koncentrationen kan även anges som 25 mg/5 mL = 5 mg/mL

ADMINISTRERING

Flekainid kan ges i samband med mat dock ej med mejeriprodukter eftersom de kan minska läkemedelsupptaget.

Oralt

Enteralt

RIMLIG DOS för Flekainid oralt 5 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,2 mg/kg	-	0,2 mL	0,4 mL	2 mL
0,5 mg/kg	-	0,5 mL	1 mL	5 mL
2 mg/kg	-	2 mL	4 mL	20 mL

RIMLIG DOS UTIFRÅN KROPPSYTA

	0,1 m ²	0,25 m ²	0,5 m ²	1,5 m ²
16,7 mg/m ²	-	0,84 mL	1,67 mL	-
25 mg/m ²	-	1,25 mL	2,5 mL	-
33,3 mg/m ²	-	1,66 mL	3,33 mL	-

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Flecainide (licensprodukt)

5 mg/mL, Oral lösning

Förvaras vid högst 25 °C. Får ej kyl- eller frysförvaras.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Behandlingen ordineras i samråd med barnkardiolog.

Monitorera blodtryck, EKG, QRS och QRT- tiden dagligen, samt S-flekainid efter behov. Elektrolytrubbningar, speciellt hypo- eller hyperkalemi, bör korrigeras innan behandling påbörjas.

För hjälp med beräkning av kroppsytta, se länk (klickbar):

<http://icd.internetmedicin.se/dos-yta>

Allvarlig ventrikulär takykardi (VT) och supraventrikulär takykardi (SVT)

Barn 1 mån - 18 år: Initialt 0,2 - 0,5 mg/kg x 3

Måldos 1 - 2 mg/kg x 3, max 8 mg/kg/DYGN

Dosering baserad på kroppsytta:

Nyfödda: 35 - 50 mg/m² x 2

Barn under 6 mån: 16,7 - 25 mg/m² x 2 - 3, max 200 mg/m²/DYGN

Barn från 6 mån: 33,3 - 50 mg/m² x 2 - 3, max 200 mg/m²/DYGN

Dosering utifrån kroppsytta är att föredra för de minsta barnen för att undvika risk för överdosering.

Optimalt terapisvar nås efter 2 - 3 dagar. Steady-state nås efter 3 - 5 dagar, om patienten har normal njur- och leverfunktion.

Eventuell doshöjning bör sker med försiktighet, en gång var 4:e dag, och bedöms utifrån effekt och serumkoncentration. Dock indikerar kliniska studier att doser över 8 mg/kg inte ger förbättrat behandlingssvar utan enbart ökad risk för biverkningar.





Flekainid oralt 5 mg/mL

(Licens) oral lösning

ÖVRIG INFORMATION

Flekainid metaboliseras till stor del via CYP2D6. Samtidig behandling med CYP2D6 hämmare (t.ex. propranolol, neuroleptika) leder till ökad plasmakoncentration av flekainid. Samtidigt behandling med CYP2D6 inducerare (t.ex. fenobarbital, karbamazepin) leder till minskad plasmakoncentration av flekainid.

Dosjustering av flekainid vid samtidig behandling och vid utsättning av dessa grupper rekommenderas för att minimera risk för biverkningar.

EKG och S- flekainid koncentrationmätning är viktiga parametrar att monitorera vid eventuell doshöjning av flekainid.

Flekainid ska användas med försiktighet till njursjuka barn, dosjustering rekommenderas.

REFERENS/LÄNK

PubMed PMID Capponi G, Belli G, Giovannini M et. al praventricular tachycardias in the first year of life: what is the best pharmacological treatment? 24 years of experience in a single centre. BMC Cardiovasc Disord. 2021 Mar 15;21(1):137

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33722203>

PubMed PMID Perry JC, Garson A Jr. Flecainide acetate for treatment of tachyarrhythmias in children: review of world literature on efficacy, safety, and dosing. Am Heart J. 1992 Dec;124(6):1614-21

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1462922>

PubMed PMID Price JF, Kertesz NJ, et. al . Flecainide and sotalol: a new combination therapy for refractory supraventricular tachycardia in children <1 year of age. J Am Coll Cardiol. 2002 Feb 6;39(3):517-20.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11823091>

Rekommendation , (Grade 2B)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Summary of Product Characteristics (SPC) Flecainide Acetate 25 mg/5mL oral solution

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4736



Flekainid oralt 5 mg/mL

(Licens) oral lösning



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Tamara Alani

ePedID: 4736

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2024-02-27

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT