



Amitriptylin

(ex Saroten) tabletter

Vid behandling med amitriptylin bör EKG tas för att utesluta förlängt QT-syndrom, se Övrig information.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 10, 25 och 50 mg (ex Saroten)
Tablett 8,8 mg, 22,1 mg och 44,2 mg (Amitriptyline Strides)

Styrkorna anger innehåll av amitriptylin.

ADMINISTRERING

Intas med fördel på kvällen pga sederande effekt.

Oralt: Tabletterna kan krossas och blandas med vatten för omedelbar administrering.

Enteralt: Oral lösning rekommenderas i första hand (finns som licenspreparat).

Tabletterna kan även krossas och blandas med vatten för omedelbar administrering.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Amitriptylin (registrerad produkt)

Tablett

Burk: Förvaras i rumstemperatur. Blister: Abcur: Fuktkänsligt, förvaras i originalförpackningen. Förvaras vid högst 30 °C. Övriga tillverkare: Förvaras i rumstemperatur.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Vid behandling med amitriptylin bör EKG tas för att utesluta förlängt QT-syndrom, se Övrig information.

Ges med fördel till kvällen pga sederande effekt.

Dosen ska trappas ned successivt vid utsättning av amitriptylin.

Neuropatisk smärta

För smärtlindring med amitriptylin ska patienten titreras individuellt till den lägsta effektiva dosen där adekvat smärtlindring erhålls med tolererbara läkemedelsbiverkningar.

Bör ordineras i samråd med smärtspecialist.

Barn 2 - 11 år: Initialt 0,2 - 0,5 mg/kg x 1, max 10 mg/dos.
Dosen kan ökas vid behov till max 1 mg/kg x 2 av smärtspecialist.

Barn 12 - 18 år: 10 mg x 1. Dosen kan ökas gradvis vid behov till 75 mg x 1. Vid behov av högre doser än 75 mg bör det ordineras av smärtspecialist.

Utvärdera behandlingens effekt på smärta, funktionsnivå samt biverkningar och avsluta om önskad effekt inte uppnås.

Cykliska (periodiska) kräkningar

Första linjens förebyggande behandling

Barn från 5 år: Startdos: 0,25 - 0,5 mg/kg x 1. Kan trappas upp med 5 - 10 mg/VECKA.

Underhållsdos: 1 - 1,5 mg/kg x 1, kan vid behov ökas till 2 mg/kg x 1.

Terapiresistent primär nattlig enures

Barn 6 - 10 år: 10 - 20 mg x 1

Barn från 11 år: 25 - 50 mg x 1

Dosen trappas upp succesivt och ges 1 - 1½ timme före sänggående.





Amitriptylin

(ex Saroten) tabletter

ÖVRIG INFORMATION

Innan behandling och efter uppnådd målkoncentration bör EKG tas för att utesluta förlängt QT-syndrom. Fall av QT-förlängning har rapporterats, därför ska det ges med försiktighet till patienter med bradykardi eller hos patienter som använder QT-förlängande läkemedel t ex. ondansetron.

Sätt ut amitriptylin flera dagar innan kirurgi, om möjligt, då anestetika under behandling med amitriptylin kan öka risken för hypotension och arytmier.

Amitriptylin bör ges med stor försiktighet till patienter med hypertyreos eller patienter som får tyroideahormoner, då hjärtarytmier kan utvecklas.

Använd amitriptylin med försiktighet till patienter med epileptisk sjukdom då det kan sänka tröskeln för anfall. Försiktighet bör även iakttas vid behandling av patienter med svår lever- eller hjärt-kärlsjukdom, pylorusstenos och paralytisk ileus.

Vid långvarig smärta bör amitriptylin kombineras med icke farmakologisk behandling.

Amitriptylin kan orsaka antikolinerga biverkningar som yrsel, förvirring, urinretention samt muntorrhet.



Amitriptylin

(ex Saroten) tabletter



REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Internetmedicin - Enures, sängvätning

<https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=436>

Internetadress Region Skåne - Stöd vid läkemedelshantering

<https://www.lakemedelshantering.se/>

Micromedex

PubMed PMID Thour A, Marwaha R. Amitriptyline. 2022 May 15. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30725910>

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnnefrologisk Förening - Enuresvårdprogram 2019

<https://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Barnläkarföreningen, , Svenska Föreningen för Pediatrisk Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition - Cykliska kräkningar hos barn och ungdomar

<https://gastro.barnlakarforeningen.se/vardprogram-2/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Jennie Ekman

ePedID: 4738

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2023-02-07

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT