



## Azitromycin oral

(ex Azitromax) tabletter

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 250 och 500 mg

Azitromycin finns även som oral suspension 40 mg/mL, se annan instruktion.

### ARBETSMILJÖ

Allergirisk, hantera enligt lokal rutin, azitromycin kan i sällsynta fall orsaka allergiska reaktioner. Undvik direktkontakt med läkemedlet.

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt:

Risken för magbiverkningar kan minska om azitromycin tas tillsammans med mat.

Tablett 250 mg saknar brytskåra. Tablett 500 mg kan delas i två lika stora doser.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Azitromycin (registrerad produkt)

250 mg, Filmdragerad tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Gäller båda styrkorna och alla fabrikat.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Borreliainfektion i huden, vid penicillinallergi typ 1

Barn 1 mån - 8 år: För dosering se instruktion för oral suspension.

#### Pneumoni med atypiska agens, alternativ vid penicillinallergi typ 1

Barn 3 - 18 år:

Dag 1: 10 mg/kg x 1, max 500 mg

Dag 2 - 5: 5 mg/kg x 1, max 250 mg/dos

Behandlingstid: 5 dagar

#### Akut otitis media (AOM), alternativ vid penicillinallergi typ 1

Barn 6 mån - 18 år: 10 mg/kg x 1, max 500 mg/dos

Behandlingstid: 3 dagar

#### Streptokocktonsillit, alternativ vid penicillinallergi typ 1

Barn 3 - 18 år:

Dag 1: 10 mg/kg x 1, max 500 mg

Dag 2 - 5: 5 mg/kg x 1, max 250 mg/dos

Behandlingstid: 5 dagar

Alternativt 20 mg/kg x 1, max 500 mg/dos i 3 dagar

### ÖVRIG INFORMATION

Azitromycin har liksom övriga makrolider otillräcklig aktivitet mot Haemophilus influenzae.





## Azitromycin oralt

(ex Azitromax) tabletter

### REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/behandlingsrekommendationer-for-vanliga-infektioner-i-oppenvard/>

Internetadress RAF, Referensgruppen för antibiotikafrågor – Antibiotikakompendium

<https://www.sls.se/raf/lakemedel/antibiotikakompendium/>

Svenska Barnläkarföreningen Delförening för barninfektioner, Borreliainfektion hos barn

<http://www.blf.net/inf/vardprogram/>

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2020-03-17

ePedID: 4742

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-03-24

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2020-03-24

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**