



Azitromycin oralt

(ex Azitromax) tabletter

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Filmdragerad tablett 250 och 500 mg

Azitromycin finns även som oral suspension, se annan instruktion.

ARBETSMILJÖ

Allergisk, hantera enligt lokal rutin, azitromycin kan i sällsynta fall orsaka allergiska reaktioner. Undvik direktkontakt med läkemedlet.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt:

Risken för magbiverkningar kan minska om azitromycin tas tillsammans med mat.

Filmdragerad tablett 500 mg kan delas i två lika stora doser. Filmdragerad tablett 250 mg saknar brytskåra och kan inte delas för att ge en mindre dos.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Azitromycin (registrerad produkt)

250 mg, Filmdragerad tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Gäller båda styrkorna och alla fabrikat.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Lägsta dos som kan ges med tabletter är 250 mg. Vid behov av lägre dos rekommenderas oral suspension, se annan instruktion.

Borreliainfektion med erytema migrans och/eller lymfocytom, alternativ vid diagnostiserad penicillinallergi

Barn 1 mån - 8 år:

Dag 1: 10 mg/kg x 1, max 500 mg

Dag 2 - 5: 5 mg/kg x 1, max 250 mg/dag

Behandlingstid: 5 dagar

Pneumoni med atypiska agens, alternativ vid diagnostiserad penicillinallergi

Barn 3 - 18 år:

Dag 1: 10 mg/kg x 1, max 500 mg

Dag 2 - 5: 5 mg/kg x 1, max 250 mg/dag

Behandlingstid: 5 dagar

Akut otitis media (AOM), alternativ vid diagnostiserad penicillinallergi

Barn 6 mån - 18 år: 10 mg/kg x 1, max 500 mg

Behandlingstid: 3 dagar

Streptokocktonsillit, alternativ vid diagnostiserad penicillinallergi

Barn 3 - 18 år:

Dag 1: 10 mg/kg x 1, max 500 mg

Dag 2 - 5: 5 mg/kg x 1, max 250 mg/dag

Behandlingstid: 5 dagar

Alternativt 20 mg/kg x 1, max 500 mg, i 3 dagar



Azitromycin oralt

(ex Azitromax) tabletter



ÖVRIG INFORMATION

Azitromycin har liksom övriga makrolider otillräcklig aktivitet mot Haemophilus influenzae.

Vid borreliainfektion används doxycyklin till barn från 8 år vid diagnostiserad penicillinallergi.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/behandlingsrekommendationer-for-vanliga-infektioner-i-oppenvard/>

Internetadress RAF, Referensgruppen för antibiotikafrågor – Antibiotikakompendium

<https://www.sls.se/raf/lakemedel/antibiotikakompendium/>

Svenska Barnläkarföreningen Svensk barninfektionsförening, Borreliainfektion hos barn

<https://inf.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2020-04-28

ePedID: 4742

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-04-29

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-04-29

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT