



Azitromycin oralt 40 mg/mL

(ex Azitromax) oral suspension

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Alt. 1: Färdigspädd oral suspension 40 mg/mL (Azitromax, Azitromycin Ebb)

Alt. 2: Pulver till oral suspension 40 mg/mL, späds på vårdenhet

OBS! Rutin för hantering av orala antibiotikapulver ska finnas för vårdenheten om alt. 2 används.

EN-STEGSSPÄDNING

Alt. 2 Pulver till slutvolym 22,5 mL

Azitromycin		Sterilt Vatten		ORAL SUSP
1 flaska	+		=	40 mg/mL
1 st		12 mL		22,5 mL

Beredningsinstruktion:

Pulvret bidrar med volym, därför blir slutvolymen betydligt större än den tillsatta volymen sterilt vatten.

ARBETSMILJÖ

Allergirisk, hantera enligt lokal rutin, azitromycin kan i sällsynta fall orsaka allergiska reaktioner. Undvik direktkontakt med läkemedlet.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Skaka flaskan väl innan varje administrering.

Risken för magbiverkningar kan minska om azitromycin tas tillsammans med mat.

Oralt

Enteralt i sond

RIMLIG DOS för Azitromycin oralt 40 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
5 mg/kg	-	0,62 mL	1,25 mL	6,25 mL
10 mg/kg	-	1,25 mL	2,5 mL	12,5 mL

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Borreliainfektion i huden, vid penicillinallergi typ 1

Barn 1 mån - 8 år:

Dag 1: 10 mg/kg x 1, max 500 mg

Dag 2 - 5: 5 mg/kg x 1, max 250 mg/dos

Behandlingstid: 5 dagar

Pneumoni med atypiska agens, alternativ vid penicillinallergi typ 1

Barn 3 - 18 år:

Dag 1: 10 mg/kg x 1, max 500 mg

Dag 2 - 5: 5 mg/kg x 1, max 250 mg/dos

Behandlingstid: 5 dagar

Akut otitis media (AOM), alternativ vid penicillinallergi typ 1

Barn 6 mån - 18 år: 10 mg/kg x 1, max 500 mg/dos

Behandlingstid: 3 dagar

Streptokocktonsillit, alternativ vid penicillinallergi typ 1

Barn 3 - 18 år:

Dag 1: 10 mg/kg x 1, max 500 mg

Dag 2 - 5: 5 mg/kg x 1, max 250 mg/dos

Behandlingstid: 5 dagar

Alternativt 20 mg/kg x 1, max 500 mg/dos i 3 dagar

ÖVRIG INFORMATION

Azitromycin har liksom övriga makrolider otillräcklig aktivitet mot Haemophilus influenzae.





Azitromycin oralt 40 mg/mL

(ex Azitromax) oral suspension

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Azitromycin (registrerad produkt)

40 mg/mL, Oral suspension

HÅLLBAR: Färdigberedd suspension är hållbar 10 dagar. Förvaras i högst 30 °C.

1 flaska, Pulver till oral suspension

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 30 °C.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/behandlingsrekommendationer-for-vanliga-infektioner-i-oppenvard/>

Internetadress RAF, Referensgruppen för antibiotikafrågor – Antibiotikakompendium

<https://www.sls.se/raf/lakemedel/antibiotikakompendium/>

Svenska Barnläkarföreningen Delförening för barninfektioner, Borreliainfektion hos barn

<http://www.blf.net/inf/vardprogram/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2020-03-17

ePedID: 4743

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-03-24

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-03-24

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT