



Klindamycin oralt

(ex Dalacin) kapslar

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kapslar 150 mg och 300 mg

ARBETSMILJÖ

Allergirisk, hantera enligt lokal rutin, långvarig eller upprepad kontakt kan i sällsynta fall ge upphov till allergiska reaktioner.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt:

Kapslarna ska sväljas hela tillsammans med vätska, patienten ska sitta upp. Får inte öppnas/delas pga risk för skador på matstrupen.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Klindamycin (registrerad produkt)

150 mg, Kapsel, hård

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25°C.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Kapslarnas styrka och de olika doseringarna för olika indikationer gör att kapslarna är lämpliga för barn från ca 10 - 30 kg.

Bakteriell infektion med bakterier känsliga för klindamycin

Barn 1 mån - 18 år: 5 mg/kg x 3 - 4, max 1800 mg/dygn

Vid allvarliga infektioner bör intravenös behandling övervägas.

Akut streptokocktonsillit, vid recidiv inom 4 veckor samt vid penicillinallergi

Barn 1 mån - 18 år: 5 mg/kg x 3, max 900 mg/dygn

Behandlingstid: 10 dagar

Endokarditprofylax, vid penicillinallergi

Barn 1 mån - 18 år:

Engångsdos 30 - 60 minuter före ingrepp: 15 mg/kg, max 600 mg

Impetigo, sårinfektioner, erysipelas, stjärtfluss, preseptal cellulit; vid penicillinallergi

Barn 1 mån - 18 år: 5 mg/kg x 3, max 900 mg/dygn

Behandlingstid: 7 - 10 dagar

Uppföljande peroral behandling vid skelettinfektioner så som osteomyelit, septisk artrit och spondylodiskit, dock ej vid infektion orsakad av Kingella kingae eller Haemophilus influenzae. Alternativ vid penicillinallergi.

Barn 1 mån - 18 år: 10 mg/kg x 3, max 900 mg/dygn

Total behandlingstid, inkl. inledande intravenös behandling: minst 4 veckor



Klindamycin oralt (ex Dalacin) kapslar

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/behandlingsrekommendationer-for-vanliga-infektioner-i-oppenvard/>

Internetadress Kloka Listan

<http://klokalistan.janusinfo.se/2018/Infektioner/>

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp. En systematisk litteraturöversikt 2010

<http://www.sbu.se/contentassets/bfd8f676b4ed409898523fabecefab19/antibiotikaprofylax.pdf>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4747

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2018-09-04

ePedID: 4747

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2018-09-05

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-09-05

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT