



## Klindamycin oralt

(ex Dalacin) kapslar

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kapslar 150 mg och 300 mg (ex Dalacin)

Klindamycin finns även som oral lösning 15 mg/mL, se annan instruktion.

### ARBETSMILJÖ

Allergirisk, hantera enligt lokal rutin. Långvarig eller upprepad kontakt kan i sällsynta fall ge upphov till allergiska reaktioner.

### ADMINISTRERING

Oralt:

Kapslarna ska sväljas hela tillsammans med vätska, patienten ska sitta upp. Får inte öppnas/delas pga risk för skador på matstrupen.

Enteralt:

Användning av oral lösning rekommenderas, se annan instruktion.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Klindamycin (registrerad produkt)

Kapsel, hård

Förvaras vid högst 25 °C. Gäller båda styrkorna.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

Kapslarnas styrka och de olika doseringarna för olika indikationer gör att kapslarna är lämpliga för barn från ca 10 - 30 kg.

#### Bakteriell infektion med bakterier känsliga för klindamycin

Barn 1 mån - 18 år: 5 mg/kg x 3 - 4, max 1,8 gram/DYGN

Alternativt fast dosering enl. FASS:

Barn 30 - 45 kg: 150 mg x 3

Barn över 45 kg: 300 mg x 2 alt. 150 mg x 3 - 4. Dosen kan ökas till 300 mg x 3 - 4.

Vid allvarliga infektioner bör intravenös behandling övervägas.

#### Akut streptokocktonsillit, vid recidiv inom 4 veckor samt vid penicillinallergi

Barn 1 mån - 18 år: 5 mg/kg x 3, max 900 mg/DYGN

Behandlingstid: 10 dagar

#### Endokarditprofylax, vid penicillinallergi

Barn 1 mån - 18 år:

Engångsdos 30 - 60 min före ingrepp: 15 mg/kg, max 600 mg

#### Impetigo, sårinfektioner, erysipelas, stjärtfluss, preseptal cellulit; vid penicillinallergi

Barn 1 mån - 18 år: 5 mg/kg x 3, max 900 mg/DYGN

Behandlingstid: 7 - 10 dagar

#### Uppföljande peroral behandling vid skelettinfektioner så som osteomyelit, septisk artrit och spondylodiskit, dock ej vid infektion orsakad av *Kingella kingae* eller *Haemophilus influenzae*. Alternativ vid penicillinallergi.

Barn 1 mån - 18 år: 10 mg/kg x 3, max 900 mg/DYGN

Total behandlingstid, inkl. inledande intravenös behandling: minst 4 veckor





## Klindamycin oralt

(ex Dalacin) kapslar

### REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/behandlingsrekommendationer-for-vanliga-infektioner-i-oppenvard/>

Internetadress Kloka Listan

<https://klokalistan.se/>

Internetadress RAF, Referensgruppen för antibiotikafrågor – Antibiotikakompendium

<https://www.sls.se/raf/lakemedel/antibiotikakompendium/>

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp. En systematisk litteraturoversikt 2010

<http://www.sbu.se/contentassets/bfd8f676b4ed409898523fabecfab19/antibiotikaprofylax.pdf>

### LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#4747](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4747)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 4747

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2023-05-16

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**