



Folsyra oralt 1 mg

(ex Folacin) tablett

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: tabletterna kan delas för att underlätta nedsväljningen, men inte för att få två lika stora doser.

Enteralt i sond: användning av folsyra oral lösning 0,1 mg/mL (extempore) rekommenderas.

ÖVRIG INFORMATION

Höga doser folsyra kan hematologiskt dölja B12-brist vilket i sig kan leda till neurologiska komplikationer.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Megaloblastisk anemi

Barn 1 mån - 18 år: 1 mg x 1

Om patienten inte kan svälja tablett finns oral lösning 0,1 mg/mL (extempore) att tillgå.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Micromedex

Pediatric Dosage Handbook

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2018-10-03

ePedID: 4748

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2018-10-03

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-10-03

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT