



## Metotrexat oralt

(ex Metotab) tabletter

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Methotrexate Orion Pharma 2,5 mg och Metotab 2,5 , 7,5 och 10 mg

### ARBETSMILJÖ

Cytostatika, hantera enligt lokal rutin, -

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: Tabletterna kan lösas upp i en oral spruta med 5 - 7 mL vatten. Det tar några minuter för tabletterna att lösa upp sig. För att säkerställa att patienten får i sig hela dosen ska man dra upp ytterligare vatten i sprutan efter att läkemedlet intagits och administrerats. Proceduren upprepas vid behov.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Metotrexat (registrerad produkt)

2,5 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Methotrexate Orion Pharma ska förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Akut lymfatisk leukemi (ALL)

Barn: initialt 20 mg/m<sup>2</sup> EN gång/VECKA, dosen titreras upp till önskad dos.  
Behandlingstid: två år efter start av induktionsfasen.

#### Inflammatorisk tarmsjukdom

Barn 2 - 18 år: 10 - 15 mg/m<sup>2</sup> EN gång/VECKA, max 25 mg/DOS

#### Juvenil idiopatisk artrit (JIA)

Barn 2 - 18 år: 10 - 15 mg/m<sup>2</sup> EN gång/VECKA, max 25 mg/DOS.  
Metotrexat kan tidigast sättas ut 6 mån efter symtomfrihet.

#### Svår psoriasis

Ordineras endast av specialtläkare.

Barn 2 - 18 år: Initialt 0,2 mg/kg EN gång/VECKA, max. 10 mg/DOS. Dosen kan vid behov ökas till 0,4 mg/kg EN gång/VECKA, max 25 mg/DOS.  
Behandlingen bör avslutas om adekvat effekt inte ses inom 3 mån från behandlingsstart.





## Metotrexat oralt

(ex Metotab) tabletter

### ÖVRIG INFORMATION

Innan behandlingstart med metotrexat vid ALL ska följande kriterier vara uppfyllda:

- Absoluta neutrofila över  $0,5 \times 10^9/L$  och
- Trombocyter över  $50 \times 10^9/L$

Metotrexat är kontraindicerat vid svår njur och leversjukdom. Kontrollera levertransferaser och njurfunktion innan behandling med metotrexat påbörjas.

Dosen metotrexat behöver justeras om levertransferaserna ökar till mer än det dubbla över referensvärdet.

Läkemedel som påverkar njurfunktionen t ex aminoglykosider samt antiinflammatoriska läkemedel t ex NSAID kan minska utsöndringen av metotrexat och leda till systemiskt toxicitet. Utsöndringen av metotrexat påverkas också vid kombination med protonpumpshämmare. Undvik därför dessa preparat under behandlingstiden med metotrexat.

Folsyratillskott ska ges tidigast 24 timmar efter metotrexatdosen.

Allmän vaccinationsstatus ska tas på barnet innan metotrexatbehandlingen påbörjas. Kontrollera alltid serologi för varicella innan behandlingsstart. Vaccination med levande vacciner ska undvikas under behandling med metotrexat.

Alkohol i kombination med metotrexat kan öka risken för leverskada.

Metotrexat bör sättas ut 1-2 veckor innan större operationer.





## Metotrexat oralt (ex Metotab) tabletter

### REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Farmakologisk behandling av JIA

<https://reuma.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/11/2019/11/Farmakologisk-beh-JIA-2019-05-31b.pdf>

Läkemedelsverket Nyheter- Nya åtgärder för att undvika potentiella dödliga doser av metotrexat

<https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2019/Nya-atgarder-for-att-undvika-potentiellt-dodliga-doser-av-metotrexat/>

Micromedex

NOPHO protokoll ALL TOGETHER

A Treatment study protocol of the ALL Together Consortium for children and young adults (1-45 years of age) with newly diagnosed acute lymphoblastic leukaemia (ALL)

<http://www.nopho.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnreumatologisk Förening - Farmakologiska behandlingsrutiner för JIA

<https://reuma.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Föreningen för Pediatrik Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition - IBD inflammatorisk tarmsjukdom hos barn och ungdomar

<http://gastro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

---

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2020-06-03

ePedID: 4755

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2020-06-03

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2020-06-03

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**