



Racekadotril oralt 30 mg/15 mL

(Hidrasec) oral suspension

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Racekadotril granulat till oral suspension 30 mg (Hidrasec) vid behov av att kunna administrera delmängd. Använd i första hand 10 mg om tillgänglig, se annan instruktion.

EN-STEGSSPÄDNING

Hidrasec		Sterilt Vatten		ORAL SUSP
30 mg				2 mg/mL
1 st	+	15 mL	=	15 mL

Beredningsinstruktion:

Slamma upp granulatet i 15 mL vätska. Sterilt vatten kan vara lämpligt för infektionskänsliga barn, till övriga patienter går kranvatten bra.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: Granulatet kan blandas i mat, vatten eller vätskeersättning. Blanda väl.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Hidrasec (registrerad produkt)

2 mg/mL, Oral suspension

HÅLLBAR: Inga särskilda förvaringsanvisningar. Används omgående efter blandning med vätska.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Kompletterande symtomatisk behandling av akut diarré

Barn över 3 mån: 1,5 mg/kg x 3

Alternativt (fast dosering):

Barn över 3 mån och under 9 kg: 10 mg x 3 (5 mL)

9 - 12 kg: 20 mg x 3 (10 mL)

13 - 27 kg: 30 mg x 3 (15 mL)

Över 27 kg: 60 mg x 3

Behandling bör fortsätta tills barnet fått två normala avföringar.

Behandlingstid max 7 dagar.

ÖVRIG INFORMATION

Innehåller sockaros.

Ges tillsammans med vätskeersättning och vanliga stödåtgärder.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2019-09-02

ePedID: 4763

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-09-04

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-09-04

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT