



Trametinib oralt 0,05 mg/mL

(Mekinist) oral lösning

EN-STEGSSPÄDNING

Mekinist		Sterilt Vatten		ORAL LÖSN
5 mg				0,05 mg/mL
1 st	+	90 mL	=	100 mL

Beredningsinstruktion:

- 1) Använd lämplig beredningsanordning.
- 2) Knacka lätt på flaskan så allt pulver lösgörs innan flaskan öppnas.
- 3) Häll över vattnet till flaskan, förslut sedan med kork och skaka kraftigt.
- 4) Låt stå 5 - 10 min tills skumbildningen lagt sig.

ARBETSMILJÖ

Cytostatika, hantera enligt lokal rutin, Skyddmaterial vid iordningställande: Handskar avsedda för cytotatika, plastad underlägg, munskydd samt plastförkläde.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt:

- Innan administrering rotera flaskan försiktigt 2 - 3 gånger. Håll fingret på locket för att undvika att det går upp. Vid skumbildning låt flaskan vila i minst 1 min.
- Använd en oral spruta, se till att doseringssprutan är helt ihoptryckt så att ingen luft finns i kolven.
- För in sprutan i adaptern, vänd på flaskan och dra ut minst 5 mL lösning. Spruta därefter tillbaka lösningen i flaskan. Upprepa detta tills luftbubblorna försvinner i sprutan.
- Dra ut önskad mängd läkemedel och administrera till patienten så fort som möjligt.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Höggradigt gliom samt tumörer med en BRAAF V600E eller V600K mutation

Barn 1 mån - 18 år: 0,025 mg/kg x 1, max 2 mg

RIMLIG DOS FÖR 0,05 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,025 mg/kg	-	2,5 mL	5 mL	25 mL

REFERENS/LÄNK

Internetadress Vårdhandboken

<http://www.varldhandboken.se/>

Personlig kontakt Product development, Upper Providence, Collegeville, PA

Rekommendation (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2018-11-08

ePedID: 4764

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-11-08

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-11-08

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT





Trametinib oralt 0,05 mg/mL

(Mekinist) oral lösning

ÖVRIG INFORMATION

Tillgängligt via compassionate use.

Hantering av spill:

Ta på skyddshandskar avsedda för cytostatika, skyddsrock med muddar samt munskydd (vid spill av pulver).

Spill av pulver:

Använd våta pappershandukar för att ta upp utspillt pulver.

Spill av lösning:

Använd torra pappershanddukar för att torka bort mindre spill (under 5 mL). Använd spillbox för spill över 5 mL.

Allt kontaminerat material ska hanteras som riskavfall.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Mekinist (klinisk prövning)

5 mg, Pulver till oral lösning

HÅLLBAR: Förvaras i kylskåp.

0,05 mg/mL, Oral lösning

HÅLLBAR: 35 dagar i kylskåp eller rumstemperatur dock ej över 25 °C. Får ej frysas eller utsättas för ljus.