



Trametinib oralt 0,05 mg/mL

(Mekinist) oral lösning

EN-STEGSSPÄDNING

Mekinist		Sterilt Vatten		ORAL LÖSN
5 mg	+		=	0,05 mg/mL
1 st		90 mL		100 mL

Beredningsinstruktion:

- 1) Använd (champagneglaset + lock).
- 2) Knacka lätt på trametinibflaskan så all pulver lösgörs innan flaskan öppnas.
- 3) Häll över vattnet till flaskan, förslut sedan med kork och skaka kraftigt.
- 4) Låt stå 5 - 10 min till skumbildning lagt sig.

ARBETSMILJÖ

Cytostatika, hantera enligt lokal rutin, Skyddmaterial vid iordningställande: Handskar avsedda för cytostatika, plastad underlägg, munskydd samt plastförkläde.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt:

- Innan administrering rotera flaskan försiktigt 2 - 3 gånger. Håll fingret på locket för att undvika att den går upp. Vid skumbildning låt flaskan vila i minst 1 min.
- Använd en oral spruta, se till att doseringssprutan är helt ihoptryckt så att ingen luft finns i kolven.
- För in sprutan i adaptorn, vänd på flaskan och dra ut minst 5 mL lösning. Spruta därefter tillbaka lösningen i flaskan. Upprepa detta tills luftbubblorna försvinner i sprutan.
- Dra ut önskad mängd läkemedel och administrera till patienten så fort som möjligt.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Höggradigt gliom samt tumörer med en BRAAF V600E eller V600K mutation

Barn 1 mån - 18 år: 0,025 mg/kg x 1, max 2 mg

RIMLIG DOS FÖR 5 mg

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,025 mg/kg	-	-	0,05 mL	0,25 mL
0,025 mg/kg	-	-	5 mL	25 mL

REFERENS/LÄNK

Internetadress Vårdhandboken

<http://www.varhandboken.se/>

Personlig kontakt Product development, Upper Providence, Colleagueville, PA

Rekommendation ,(Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2018-10-12

ePedID: 4764

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-10-18

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-10-18

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT





Trametinib oralt 0,05 mg/mL

(Mekinist) oral lösning

ÖVRIG INFORMATION

Tillgängligt via compassionate use.

Hantering av spill:

- 1) Ta på skyddshandskar avsedda för cytostatika, skyddrock med muddar samt munskydd (vid spill av pulver).
- 2) Använd våta papperhandukar för att ta upp utspilld pulver. Använd torra papperhandukar för att torka bort mindre spill (under 5 mL). Använd spillbox för spill över 5 mL.
- 3) All kontaminerad material ska hanteras som riskavfall.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Mekinist (klinisk prövning)

5 mg, Pulver till oral lösning

HÅLLBAR: Förvaras i kylskåp.

0,05 mg/mL, Oral lösning

HÅLLBAR: 35 dagar i kylskåp eller rumstemperatur dock ej över 25 c°. Får ej frysas eller utsättas för ljus.