



Alginsyra + tillsatser oralt

(Gaviscon) oral suspension

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: Den orala suspensionen ska omskakas före användning.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Gaviscon (registrerad produkt)

Oral suspension

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C i skydd mot kyla.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Refluxesofagit

Gastroesofageal refluxsjukdom

Barn 6 - 11 år: 5 - 10 mL vid behov

Barn 12 - 18 år: 10 - 20 mL vid behov

Dos tas ca 30 min efter måltid och i samband med sänggåendet.

ÖVRIG INFORMATION

Gaviscon kan minska absorptionen av ett flertal läkemedel, t ex tvåvärt järn genom bildning av kelatkomplex. Minst två timmars intervall mellan administreringarna rekommenderas.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Legemidler til barn (Norskt kompetansenettverk for legemidler til barn) - Gaviscon til barn

<https://www.legemidlertilbarn.no/nyheter/Sider/2016/Gaviscon-til-barn.aspx>

Rekommendation ,(Grade 2D)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Föreningen för Pediatrik Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition - GERD

<http://gastro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2021-02-23

ePedID: 4765

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-03-09

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2021-03-09

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT