



## Vorikonazol oralt

(ex Vfend) tabletter

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 50 och 200 mg

Vorikonazol finns även som oral suspension, se annan instruktion. Denna rekommenderas för barn 2 - 12 år, se Övrig information.

### ARBETSMILJÖ

Undvik inandning och direktkontakt med produkten. Riskmoment är hantering av pulver eller krossning av tablett, hantera enligt lokal riktlinje. Kan orsaka lättare ögonirritation.

### ADMINISTRERING

Vorikonazol ska tas minst 1 tim före eller 2 tim efter måltid. Tabletterna bör sväljas hela.

Oralt

Enteralt:

Användning av oral suspension rekommenderas i första hand. Tabletterna kan krossas och lösas i vatten, men det finns risk för ocklusion i den enterala infarten.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Vorikonazol (registrerad produkt)

Filmdragerad tablett

Förvaras i rumstemperatur. Gäller båda styrkorna.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Invasiva mykoser inkl. aspergillos, behandling och profylax

Vanligen efter inledande intravenös behandling.

Barn 2 - 14 år, under 50 kg

Från dag 1: 9 mg/kg x 2. Dosen kan vid behov ökas i steg om 1 mg/kg upp till 350 mg x 2, därefter i steg om 50 mg efter behov.

Barn 2 - 14 år, från 50 kg

Dag 1: 400 mg x 2

Från dag 2: 200 mg x 2, kan ökas till 300 mg x 2

Barn från 15 år, under 40 kg

Dag 1: 200 mg x 2

Från dag 2: 100 mg x 2, kan ökas till 150 mg x 2

Barn från 15 år, från 40 kg

Dag 1: 400 mg x 2

Från dag 2: 200 mg x 2, kan ökas till 300 mg x 2

### ÖVRIG INFORMATION

Elektrolytrubbningar såsom hypokalemi, hypomagnesemi och hypokalcemi ska följas och korrigeras, om nödvändigt, innan start av samt under behandling med vorikonazol.

Kontrollera plasmakoncentrationen av vorikonazol vid misstanke om neurologisk biverkan. Dosminskning kan behövas.

Vorikonazol hämmar flera CYP-enzym, bl.a. CYP3A4, och har betydelsefulla interaktioner med många läkemedel t.ex. immunsuppressiva.

Den orala doseringen för barn baseras på studier där oral suspension har använts. Bioekvivalensen mellan oral suspension och tabletter har inte undersökts hos barn och därför rekommenderas den orala suspensionen till barn 2 - 12 år.



## Vorikonazol oralt

(ex Vfend) tabletter



### REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation , (Grade 2C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

---

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 4768

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2022-03-30

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**