



Rifampicin oralt

(ex Rimactan) kapslar

Rifampicin ska alltid kombineras med annat antibiotikum/tuberkulosläkemedel p.g.a snabb resistensutveckling.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kapsel 150 och 300 mg

Rifampicin finns även som oral suspension, se annan instruktion.

ARBETSMILJÖ

Allergirisk, hantera enligt lokal rutin, -

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt:

Ska tas på fastande mage, dvs 30 - 60 min före eller 2 tim efter måltid (frukost).

Kapslarna ska sväljas hela.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Rimactan (registrerad produkt)

150 mg, Kapsel, hård

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 30 °C. Gäller båda styrkorna.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Rifampicin bör endast användas till infektioner med mykobakterier och svårare stafylokockinfektioner. Rifampicin ska alltid kombineras med annat antibiotikum/tuberkulosläkemedel p.g.a snabb resistensutveckling.

Bör ordineras i samråd med infektions/lungläkare.

Allvarlig stafylokockinfektion

I kombination med annat antibiotikum.

Barn 1 mån - 18 år:

5 - 10 mg/kg x 2 alt 10 - 20 mg/kg x 1, max 600 mg/dos, max 1200 mg/dygn

Aktiv eller latent tuberkulos

I kombination med andra tuberkulosläkemedel.

Barn 1 mån - 10 år: (10 -) 15 (- 20) mg/kg x 1, max 600 mg/dos

Barn över 10 år: 10 mg/kg x 1, max 600 mg/dos

Behandlingstid:

Aktiv tuberkulos: minst 6 mån om känslig stam, annars 9 - 12 mån

Latent tuberkulos: 3 - 9 mån

Tuberkulös meningit

I kombination med andra tuberkulosläkemedel samt annat antibiotikum.

Barn 1 mån - 18 år: 15 - 20 mg/kg x 1, max 600 mg/dos

Total behandlingstid, inkl. inledande intravenös behandling: minst 6 mån

Kolestatisk leverklåda

Barn 1 mån - 18 år:

5 mg/kg x 2, dosen kan vid behov ökas till max 10 mg/kg x 2, max 300 mg/dos.





Rifampicin oralt

(ex Rimactan) kapslar

ÖVRIG INFORMATION

Rifampicin är en potent inducerare av ett flertal CYP-enzymer bl.a. CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 och CYP3A4 vilket medför risk för interaktion med många andra läkemedel.

Kvinnor ska informeras om att inte bli gravida under behandlingen samt att använda annat antikonceptionsmedel än P-piller. Rifampicin interagerar med p-piller vilket medför ett osäkert skydd mot graviditet.

Leverenzymer, bilirubin, kreatinin samt blodstatus inkl. blodkroppsräkning bör kontrolleras regelbundet.

Rödfärgar urin och andra kroppsvätskor. Även mjuka kontaktlinser kan bli missfärgade.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress RAF, Referensgruppen för antibiotikafrågor – Antibiotikakompendium
<https://www.sls.se/raf/lakemedel/antibiotikakompendium/>

Internetadress VGR, Alfresco - TB - Tuberkulos meningit

<https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/14950?a=false&guest=true>

Micromedex

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunit.org/eped_extra/lokalreferens.html#4769

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2019-05-29

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-05-29

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

ePedID: 4769

Versionsnummer, major: 2

Giltig fr o m: 2019-05-29

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT

ePedID: 4769.2 Giltig fr o m: 2019-05-29

Versionshantering: http://eped.sll.sjunit.org/eped/instructions/show_instruction_4769.html