



Alimemazin oralt

(ex Nedeltran licens, f.d Theralen) kapslar/tabletter

Kontraindicerat till barn under 3 år

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kapsel 2,5 mg och 5 mg (Extempore)
Tablett 5 mg (Theralene, Nedeltran licens)

Till små barn, vid doser under 2,5 mg samt vid sväljsvårigheter rekommenderas orala droppar, se annan instruktion.

ADMINISTRERING

Oralt: Tablett Theralene 5 mg har brytskåra, men kan endast delas för att underlätta nedsväljning, inte för att ge halv dos.

Enteralt: orala droppar rekommenderas, se annan instruktion.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Alimemazin (licensprodukt)

Tablett

Förvaras vid högst 25 °C.

Alimemazin APL (extempore)

Kapsel, hård

Förvaras vid högst 25 °C.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Endast för kortvarig behandling. Lägsta effektiva dos ska eftersträvas.

Behandling bör inledas och övervakas av specialist i barnpsykiatri.

Ångest (bör endast användas i undantagsfall)

Barn 12 - 18 år: 10 mg vid behov, max 30 mg/DYGN

Oro (rekommenderas inte, se Övrig information)

Barn 3 - 5 år: 2,5 - 10 mg/DYGN

Barn 6 - 12 år: 2,5 - 15 mg/DYGN

Dygnsdosen bör fördelas på tre doser (morgon, middags- och kvällsdos) där en större deldos ges till kvällen.

Sömnrubning (rekommenderas inte, se Övrig information)

Barn 3 - 5 år: 2,5 - 7,5 mg

Barn 6 - 12 år: 5 - 10 mg

Dosen ges till natten.

Klåda och allergi (rekommenderas inte, se Övrig information)

Barn 3 - 5 år: 2,5 - 10 mg/DYGN

barn 6 - 12 år: 2,5 - 15 mg/DYGN

Dygnsdosen bör fördelas på tre doser (morgon, middags- och kvällsdos) där en större deldos ges till kvällen.





Alimemazin oralt

(ex Nedeltran licens, f.d Theralen) kapslar/tabletter

ÖVRIG INFORMATION

Bör ej ges till barn under 3 år pga risk för uttalad sederande effekt och andningsdepression.

Överdoserings kan leda till allvarlig intoxikation. Effekterna potentiernas av andra centraldämpande substanser samt av alkohol. Överväg riskerna och förskriv minsta möjliga mängd.

Alimemazin kan i undantagsfall användas även vid sedering på intensivvårdsavdelning och då förekommer högre doser.

För alimemazin orala droppar finns godkänd indikation klåda och allergier för barn sedan lång tid tillbaka. Idag finns dock andra antihistaminer med mindre biverkningar och dessa rekommenderas istället för alimemazin.

Fentiaziner och fentiazinliknande preparat som till exempel alimemazin har problem med hang over-effekt med kvarstående sedering, men även andra risker som till exempel förlängd QT-tid med risk för ventrikelflimmer vid överdos, samt motoriska och centralnervösa biverkningar. Alimemazin saknar indikation för sömnstörningar hos barn och rekommenderas inte.

Samtidig behandling med andra neuroleptika bör undvikas. Särskilt aripiprazol där plasmakoncentrationen av aripiprazol kan öka med 50 % och behöva dosjusteras.





Alimemazin oralt

(ex Nedeltran licens, f.d Theralen) kapslar/tabletter

REFERENS/LÄNK

Artikel Slørdal L et al. Er alimemazin et egnet søvnmiddel for barn?

<https://tidsskriftet.no/2008/10/legemidler-i-praksis/er-alimemazin-et-egnet-sovnmiddel-barn>

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

Internetadress Läkartidningen Sedativa antihistaminer – risk för allvarlig intoxikation

<https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/rapport/2021/09/sedativa-antihistaminer-risk-for-allvarlig-intoxikation/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Sömnstörningar hos barn och ungdomar

www.lakemedelsverket.se/somnstorning

PubMed PMID De Bruyne et al. Are antihistamines effective in children? A review of the evidence. 2017

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27335428>

PubMed PMID Holdø I et al, Association between prescribing hypnotics for parents and children in Norway. 2013

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23845695>

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Jennie Ekman

ePedID: 4770

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm

Versionsnummer, major: 4

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2022-10-20

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT