



Fusidinsyra utvärtes 2 %

(ex Fucidin) kräm/salva

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kräm 2 % (Fucidin, Fucidine)

Salva 2 % (Fucidin)

1 g kräm/salva innehåller 20 mg fusidinsyra.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Utvärtes:

Krämen/salvan innehåller hjälpämnen som kan ge lokala hudreaktioner samt vara irriterande för ögon och slemhinnor. Krämen ska därför användas med försiktighet i närheten av ögonen.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Fusidinsyra (registrerad produkt)

2 %, Kräm

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Öppnad tub bör användas inom 1 mån till enskild patient och inom 1 vecka till flera patienter. Gäller även salvan.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Hudinfektioner orsakade av i första hand *Stafylococcus aureus*, inkl. måttlig impetigo

Barn 1 mån - 18 år: Appliceras 2 - 3 gånger dagligen.

Om täckande förband läggs på räcker 1 applicering per dag.

Behandlingstid: 7 - 10 dagar

ÖVRIG INFORMATION

Krämen/salvan bör inte användas på rena sår eller på hud med allvarliga sårskador t.ex. brännskador.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/behandlingsrekommendationer-for-vanliga-infektioner-i-oppenvard/>

Rekommendation ,(Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2020-03-30

ePedID: 4774

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2020-03-31

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-03-31

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT