



Hydrokortison + Mikonazol utvärtes 10 + 20 mg/g

(ex Daktacort) kräm

ADMINISTRERING

Utvärtes:

Krämen ska endast appliceras på de drabbade områdena av huden. Massera in krämen tills den helt har gått in i huden.

Krämen innehåller bensoesyra som kan orsaka lokal irritation samt öka risken för gulsot hos nyfödda och butylhydroxianisol som kan ge lokala hudreaktioner och/eller irritera ögon och slemhinnor.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Hydrokortison + Mikonazol (registrerad produkt)

Kräm

HÅLLBAR: Daktacort: förvaras i kylskåp. Cortimyk: förvaras vid högst 25 °C.

Öppnad tub bör användas inom 1 mån till enskild patient och inom 1 vecka till flera patienter.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Bör endast ordinerars vid bekräftad svampinfektion eller vid mycket stark klinisk misstanke om sådan.

Tinea eller kutan candidiasis med inflammation och/eller besvärande klåda

Nyfödda: Appliceras tunt 2 gånger dagligen.

Barn 1 mån - 18 år: Appliceras tunt 2 gånger dagligen.

När inflammatoriska symtom försvunnit kan behandlingen fortsätta med enbart ett antimykotikum.

Behandlingstid: 2 - 6 veckor beroende på lokalisering och svårighetsgrad.

Behandling bör pågå minst 1 vecka efter att symtomen försvunnit.

ÖVRIG INFORMATION

Försiktighet vid applicering på stora kroppsytor eller under ocklusionsförband (inklusive blöjor) på nyfödda, spädbarn och yngre barn, särskilt vid långtidsbehandling pga risk för systemeffekt.

Vid blöjeksem ska i första hand luftning och eventuellt hydrokortison användas då svampinfektion är sällsynt i dessa fall.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

PubMed PMID Bowring A R et al. The treatment of napkin dermatitis: a double-blind comparison of two steroid-antibiotic combinations.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6374682>

PubMed PMID Wong A W K et al. Is topical antimycotic treatment useful as adjuvant therapy for flexural atopic dermatitis: randomized, double-blind, controlled trial using one side of the elbow or knee as a control.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18211496>

Rekommendation , (Grade 2D)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade



Hydrokortison + Mikonazol utvärtes 10 + 20 mg/g

(ex Daktacort) kräm



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2021-05-26
Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-06-01
Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

ePedID: 4777
Versionsnummer, major: 2
Giltig fr o m: 2021-06-01

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT