



Aciklovir utvärtes 5 %

(ex Zovirax) kräm/stift

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kräm 5 % (Anti, Zovirax)
Kutant stift 50 mg/g (ex Aciklovir Apofri)

ADMINISTRERINGSSÄTT

Utvärtes:
Hela det påverkade området ska täckas med läkemedel, även kanterna. Den som applicerar krämen bör tvätta händerna före och efter appliceringen. Stiftet ska vara patientbundet, dvs inte delas med andra.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Aciklovir (registrerad produkt)

5 %, Kräm

HÅLLBAR: Förvaras i högst 25 °C, skyddas mot kyla. Öppnad tub bör användas inom 1 mån till enskild patient och inom 1 vecka till flera patienter.

50 mg/g, Kutant stift

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur i originalförpackningen, ljuskänsligt.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Symtomatisk behandling av recidiverande munsår orsakade av Herpes simplex virus

Barn över 12 år:
Appliceras 5 gånger dagligen, ca var 4:e timme under den vakna delen av dygnet.

Behandlingen bör, för bästa effekt, påbörjas snarast efter symtomdebut men kan även starta senare.

Behandlingstid: 4 - 5 dagar

ÖVRIG INFORMATION

Krämen/stiftet ska endast användas på läppar och i ansiktet, inte på slemhinnor eller till genital herpes.

Krämen innehåller hjälpämnen som kan ge lokala hudreaktioner och/eller hudirritation.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation (Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2021-04-29

ePedID: 4782

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-05-04

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2021-05-04

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT