



Aciklovir utvärtes 5 %

(ex Zovirax) kräm

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kräm 5 % (Anti, Zovirax)

ADMINISTRERINGSSÄTT

Utvärtes:

Hela det påverkade området ska täckas med kräm, även kanterna. Den som applicerar krämen bör tvätta händerna före och efter appliceringen.

ÖVRIG INFORMATION

Krämen ska endast användas på läppar och i ansiktet, inte på slemhinnor eller till genital herpes.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Aciklovir (registrerad produkt)

5 %, Kräm

HÅLLBAR: Förvaras i högst 25 °C, skyddas mot kyla. Öppnad tub bör användas inom 1 mån till enskild patient och inom 1 vecka till flera patienter.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Symtomatisk behandling av recidiverande munsår orsakade av Herpes simplex virus

Barn över 12 år:

Appliceras 5 gånger dagligen, ca var 4:e timme under den vakna delen av dygnet.

Behandlingen bör påbörjas snarast efter symtomdebut, men kan även starta senare.

Behandlingstid: 4 - 5 dagar

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation , (Grade 2B)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2018-12-12

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2018-12-19

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

ePedID: 4782

Versionsnummer, major: 1

Giltig fr o m: 2018-12-19

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT