



Karbomer konjunktivalt

(ex Viscotears) ögongel

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Okonserverad ögongel i endosbehållare, 2 mg/g (Viscotears) och 2,5 mg/g (Oftagel)
Konserverad ögongel i tub 2 mg/g (Lakrimont, Viscotears) och droppflaska 2,5 mg/g (Oftagel)

ADMINISTRERINGSSÄTT

I nedre konjunktival-säcken:
Håll droppflaskan/tuben lodrätt och droppa ut den droppe som bildas. Droppa mellan nedre ögonlocket och ögat, var noga med att inte vidröra något med droppspetsen/tubspetsen.

En endosbehållare räcker för båda ögonen.

Endosbehållare innehåller inte konserveringsmedel. Övriga behållare innehåller konserveringsmedel som kan orsaka irritation i ögat och missfärgning av mjuka kontaktlinser.

Vid administrering av andra läkemedel i ögat ska karbomer ges sist. För tidsintervall mellan läkemedel och karbomer se resp. produktresumé.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Karbomer ögongel (registrerad produkt)

2 mg/g, Ögongel

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Bruten förpackning hållbar 4 veckor till enskild patient och 1 vecka vid användning till flera patienter.

2 mg/g, Ögongel, endosbehållare

HÅLLBAR: Förvara endosbehållarna i förpackningen, ljuskänsligt. Öppnad endosbehållare endast för engångsbruk, kassera med kvarvarande innehåll direkt efter användning. Gäller även styrkan 2,5 mg/g.

2,5 mg/g, Ögongel

HÅLLBAR: Förvara droppflaskan upp och ned för bättre droppning. Förvaras vid högst 25 °C i ytterförpackningen, ljuskänsligt. Bruten förpackning hållbar 4 veckor till enskild patient och 1 vecka vid användning till flera patienter.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Tårsubstitution ex. vid Sjögrens syndrom

Barn: 1 droppe x 3 - 4, eller vid behov

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2020-11-20

ePedID: 4787

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-11-23

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-11-23

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT