



Escitalopram oralt

(ex CipraleX) tabletter

Risk för nyttillkommen suicidalitet när antidepressiva läkemedel ges till unga.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tabletter 5, 10, 15 och 20 mg (ex CipraleX)

Escitalopram finns även som orala droppar, se annan instruktion.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: De flesta tabletter med styrkorna 10, 15 och 20 mg kan delas i två lika stora doser. Det kan dock skilja sig mellan olika tillverkare, se FASS.

Enteralt i sond: Använd i första hand orala droppar, se annan instruktion.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Escitalopram (ex CipraleX) (registrerad produkt)

5 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Gäller även styrkorna 10, 15 och 20 mg.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Behandling ska inledas och övervakas av specialist.

Depression, medelsvår till svår (2:a handsval, off-label)

Barn 12 - 18 år: Startdos 5 mg x 1, i 7 - 10 dagar

Därefter 10 mg x 1, i 2 - 3 veckor

Utvärdera och gör eventuell fortsatt dosökning med 5 mg varannan vecka tills effekt eller biverkning uppkommer.

Maxdos

Barn 12 - 18 år: 20 mg x 1

Utsättning

Planeras efter remission vid ett stabilt livsskede, april och maj kan vara lämpliga månader.

Trappa gradvis ut dosen under 8 - 10 veckor.

ÖVRIG INFORMATION

Icke farmakologisk behandling (ex strukturerad psykopedagogisk behandling) rekommenderas innan läkemedelsbehandling är aktuell.

Kontraindicerat vid känd förlängning av QT-intervall eller medfött långt QT-syndrom. Försiktighet vid behandling av patienter med andra riskfaktorer för förlängning av QT-intervallet (ex. neuroleptika) eller för andra hjärtsjukdomar. Hypokalemi och hypomagnesemi ökar risken för maligna arytmier.

Vanliga biverkningar är t.ex. insomni, ångest, minskad sexlust, minskad aptit, illamående, diarré och muntorrhet.





Escitalopram oralt (ex Cipralex) tabletter

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Svenska Föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, SFBUP - Riktlinje Depression, 2014

<http://www.sfbup.se/vardprogram/depression/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna

<https://lv.se/depression-angest>

Micromedex

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2019-03-01

ePedID: 4788

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-04-16

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-04-16

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT