



Fluoxetin oralt

(ex Fontex) tabletter/kapsel

Risk för nyttkommen suicidalitet när antidepressiva läkemedel ges till barn.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kapsel och tablett 20 mg
Dispergerbara/lösliga tabletter 10 och 20 mg (ex Fontex)

Fluoxetin finns även som oral suspension, se annan instruktion.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: Dispergerbara tabletter och lösliga tabletter 20 mg kan delas i två lika stora delar. Kan lösas i ett halvt glas vatten eller sväljas hela. Svälj omedelbart hela innehållet. Får inte tuggas.

Enteralt i sond: Dispergerbara tabletter och lösliga tabletter kan lösas upp och administreras via sond.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Fluoxetin (ex Fontex) (registrerad produkt)

20 mg, Filmragerad tablett

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 30 °C.

10 mg, Dispergerbar tablett

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 30 °C. Gäller även styrkan 20 mg.

20 mg, Kapsel, hård

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 30 °C.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Behandling ska inledas och övervakas av specialist.

För doser under 10 mg, överväg oral lösning, se annan instruktion.

Depression, medelsvår till svår (1:a handsval)

Barn 8 - 18 år: Startdos 10 mg x 1, i 7 dagar.

Därefter 20 mg x 1, i 2 - 3 veckor.

Utvärdera och öka eventuellt dosen med 10 mg varannan vecka tills effekt eller biverkning uppkommer. För underviktiga barn kan det räcka med 10 mg/dygn.

Maxdos

Barn 8 - 12 år: 40 mg x 1

Barn 13 - 18 år: 60 mg x 1

Utsättning

Planeras 6 - 12 månader efter remission vid ett stabilt livsskede, april och maj kan vara lämpliga månader.

Trappa ut dosen gradvis under 2 - 4 veckor.

Ångest och tvångssyndrom (off-label)

Barn 8 - 12 år: Startdos 5 - 10 mg x 1

Barn 13 - 18 år: Startdos 10 mg x 1

Efter en vecka dubbleras dosen. Därefter ökas dosen var 4:e vecka med 10 - 20 mg/dygn.

Måldos

Barn 8 - 18 år: 10 - 60 mg x 1

Utsättning

Planeras 12 månader efter remission vid ett stabilt livsskede. Trappa ut dosen gradvis under 2 - 4 veckor.





Fluoxetin oralt

(ex Fontex) tabletter/kapsel

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Bulimi (off-label)

Barn 8 - 18 år: Startdos 10 mg x 1, i 7 dagar

Därefter 20 mg x 1, i 2 - 3 veckor

Utvärdera och öka eventuellt dosen med 10 mg varannan vecka tills effekt eller biverkning uppkommer.

Maxdos

Barn 8 - 12 år: 40 mg x 1

Barn 13 - 18 år: 60 mg x 1

ÖVRIG INFORMATION

Icke farmakologisk behandling (ex strukturerad psykopedagogisk behandling) rekommenderas innan läkemedelsbehandling är aktuell.

Försiktighet vid behandling av patienter med andra riskfaktorer för förlängning av QT-intervallet eller för andra hjärtsjukdomar.

Hypokalemi och hypomagnesemi ökar risken för maligna arytmier.

Vanliga biverkningar är exempelvis insomni, ångest, minskad sexlust, minskad aptit, illamående, diarré, muntorrhet.

Fluoxetin (inkl. aktiv metabolit) har en halveringstid på 4 - 16 dagar. Vid byte från fluoxetin kan behandlingen därför avslutas abrupt medan nästa SSRI trappas upp mot måldos i något reducerad takt.

Fluoxetin hämmar enzymet CYP2D6 vilket kan påverka andra läkemedelsbehandlingar.





Fluoxetin oralt

(ex Fontex) tabletter/kapsel

REFERENS/LÄNK

Bok Lundgren C., FAS UT 3

Drugbank

<http://www.drugbank.ca>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Svensk psykiatriska föreningens kliniska riktlinjer - Åtstörningar

<http://www.svenskpsykiatri.se/spfs-kliniska-riktlinjer/>

Internetadress Svenska Föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, SFBUP - Riktlinje Depression, 2014

<http://www.sfbup.se/vardprogram/depression/>

Internetadress Svenska Föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, SFBUP - Riktlinje ångest- och tvångssyndrom, 2018

<http://www.sfbup.se/vardprogram/sfbups-riktlinjer-for-angest-och-tvangssyndrom/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna

<https://lv.se/depression-angest>

PubMed PMID Vitiello B and Ordóñez AE. Pharmacological treatment of children and adolescents with depression. Review.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27690663>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2020-12-08

ePedID: 4790

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-12-08

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-12-08

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT