



Fluoxetin oralt 4 mg/mL

(Fontex) oral lösning

Risk för nyttillkommen suicidalitet när antidepressiva läkemedel ges till unga.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt

Enteralt i sond

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Fluoxetin (ex Fontex) (registrerad produkt)

4 mg/mL, Oral lösning

HÅLLBAR: Förvaras i originalförpackningen vid högst 30 °C. Ljuskänsligt.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Behandling ska inledas och övervakas av specialist.

Depression, medelsvår till svår (1:a handsval)

Barn 8 - 18 år: Startdos 10 mg x 1, i 7 dagar (2,5 mL)

Därefter 20 mg x 1, i 2 - 3 veckor (5 mL)

Utvärdera och öka eventuellt dosen med 10 mg varannan vecka tills effekt eller biverkning uppkommer. För underviktiga barn kan det räcka med 10 mg/dygn.

Maxdos

Barn 8 - 12 år: 40 mg x 1

Barn 13 - 18 år: 60 mg x 1

Utsättning

Planeras 6 - 12 månader efter remission vid ett stabilt livsskede, april och maj kan vara lämpliga månader.

Trappa ut dosen gradvis under 2 - 4 veckor.

Ångest och tvångssyndrom (off-label)

Barn 8 - 12 år: Startdos 5 - 10 mg x 1 (1,25 - 2,5 mL)

Barn 13 - 18 år: Startdos 10 mg x 1 (2,5 mL)

Efter en vecka dubbleras dosen. Därefter ökas dosen var 4:e vecka med 10 - 20 mg/dygn.

Måldos

Barn 8 - 18 år: 10 - 60 mg x 1

Utsättning

Planeras 12 månader efter remission vid ett stabilt livsskede. Trappa gradvis ut dosen under 2 - 4 veckor.





Fluoxetin oralt 4 mg/mL

(Fontex) oral lösning

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Bulimi (off-label)

Barn 8 - 18 år: Startdos 10 mg x 1, i 7 dagar

Därefter 20 mg x 1, i 2 - 3 veckor

Utvärdera och öka eventuellt dosen med 10 mg varannan vecka tills effekt eller biverkning uppkommer.

Maxdos

Barn 8 - 12 år: 40 mg x 1

Barn 13 - 18 år: 60 mg x 1

ÖVRIG INFORMATION

Icke farmakologisk behandling (ex strukturerad psykopedagogisk behandling) rekommenderas innan läkemedelsbehandling är aktuell.

Försiktighet vid behandling av patienter med andra riskfaktorer för förlängning av QT-intervallet eller för andra hjärtsjukdomar.

Hypokalemi och hypomagnesemi ökar risken för maligna arytmier.

Vanliga biverkningar är exempelvis insomni, ångest, minskad sexlust, minskad aptit, illamående, diarré, muntorrhet.

Fluoxetin (inkl. aktiv metabolit) har en halveringstid på 4 - 16 dagar. Vid byte från fluoxetin kan behandlingen därför avslutas abrupt medan nästa SSRI trappas upp mot måldos i något reducerad takt.

Interagerar med och ökar plasmakoncentrationerna av bl.a. aripiprazol, haloperidol och risperidon.





Fluoxetin oralt 4 mg/mL

(Fontex) oral lösning

REFERENS/LÄNK

Bok Lundgren C., FAS UT 3

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Svensk psykiatriska föreningens kliniska riktlinjer - Åtstörningar

<http://www.svenskpsykiatri.se/spfs-kliniska-riktlinjer/>

Internetadress Svenska Föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, SFBUP - Riktlinje Depression, 2014

<http://www.sfbup.se/vardprogram/depression/>

Internetadress Svenska Föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, SFBUP - Riktlinje ångest- och tvångssyndrom, 2018

<http://www.sfbup.se/vardprogram/sfbups-riktlinjer-for-angest-och-tvangssyndrom/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna

<https://lv.se/depression-angest>

PubMed PMID Vitiello B and Ordóñez AE. Pharmacological treatment of children and adolescents with depression. Review.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27690663>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2019-03-01

ePedID: 4791

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-04-16

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-04-16

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT