



Guanfacin oralt

(Intuniv) depottabletter

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Depottabletter 1, 2, 3 och 4 mg.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt:

Guanfacin kan tas på morgonen eller till kvällen.

Tabletten ska inte krossas, tuggas eller brytas innan den sväljs då detta kan öka guanfacins frisättningshastighet.

Ska inte ges tillsammans med fettrika måltider, pga ökat upptag av läkemedlet.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Intuniv (registrerad produkt)

1 mg, Depottablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Gäller även styrkorna 2, 3 och 4 mg.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Behandling ska inledas och övervakas av specialist på beteendestörningar hos barn- och/eller ungdomar.

Viktigt med individuell dositering och kontinuerlig utvärdering av effekt och biverkningar.

ADHD, monoterapi eller tilläggsbehandling

Barn 6 - 18 år: Startdos 1 mg x 1

Upptitrering

Dosen kan ökas med högst 1 mg per vecka. Symtom på somnolens och sedering, HYPOToni och bradykardi bör monitoreras i samband med dositering.

Vid gravt nedsatt njurfunktion och nedsatt leverfunktion kan dosreduktion vara aktuellt.

Maxdos

Barn från 6 år och 25 - 41,4 kg: 4 mg x 1

Barn 13 - 18 år och 41,5 - 49,4 kg: 5 mg x 1

Barn 13 - 18 år och 49,5 - 58,4 kg: 6 mg x 1

Barn 13 - 18 år och över 58,5 kg: 7 mg x 1

Utsättning

Ska trappas ut under 2 veckor med högst 1 mg var 3:e - 7:e dag.

Blodtryck och puls ska följas under uttrappning, pga risk för HYPERToni vid för snabb utsättning.





Guanfacin oralt

(Intuniv) depottabletter

ÖVRIG INFORMATION

Guanfacin rekommenderas vid ADHD när centralstimulantia inte är lämpliga, inte tolereras eller har visats vara ineffektiva. Kan vara ett alternativ vid svår hyperaktivitet/impulsivitet.

Guanfacin interagerar med grapefruktjuice och andra läkemedel som påverkar CYP3A4 och CYP3A5 vilket kan resultera i ändrad plasmakoncentration av guanfacin.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Svenska Föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, SFBUP - Riktlinje ADHD, 2016

<http://www.sfbup.se/vardprogram/riktlinje-adhd/>

Micromedex

Pediatric Dosage Handbook

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2019-03-01

ePedID: 4793

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-04-30

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-04-30

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT