



Mirtazapin oralt

(ex Mirtin) tabletter

Risk för ökad suicidalitet när antidepressiva läkemedel ges till barn.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tabletter 15, 30 och 45 mg
Munsönderfallande tabletter 15, 30 och 45 mg

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: Tabletterna ska inte tuggas.
Munsönderfallande tabletter ska läggas på tungan och kommer snabbt lösas upp.

Vissa tabletter med styrkan 15 och 30 mg har brytskåra som möjliggör att tablettens kan delas i två lika stora delar/doser. Dock kan det skilja sig mellan olika tillverkare, se FASS.
Munsönderfallande tabletter saknar brytskåra.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Mirtazapin (registrerad produkt)

15 mg, Filmtragerad tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Gäller även styrkorna 30 och 45 mg.

15 mg, Munsönderfallande tablett

HÅLLBAR: Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt. Gäller även styrkorna 30 och 45 mg.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Behandling ska inledas och övervakas av specialist.

Behandling med mirtazapin är först aktuell när två olika SSRI-läkemedel inte haft önskad effekt.

Depression, monoterapi (off-label)

Barn 13 - 18 år: Startdos 15 mg x 1, ges till natten i 1 vecka
Därefter trappas dosen upp med 15 mg.

Utvärdering efter 2 - 3 veckor och ev. ytterligare dosökning, max 45 mg.

Utsättning

Planeras efter remission vid ett stabilt livsskede, april och maj kan vara lämpliga månader.

Trappa gradvis ut dosen under 4 - 6 veckor.

Depression med sömnstörning eller ångest, tillägsbehandling (off-label)

Barn 13 - 18 år: Startdos 15 - 30 mg x 1, ges till natten
Kan dosökas efter 1 vecka, max 45 mg

Utsättning

Planeras efter remission vid ett stabilt livsskede, april och maj kan vara lämpliga månader.

Trappa gradvis ut dosen under 4 - 6 veckor.

Sömnstörning, korttidsbehandling (off-label)

Barn 13 - 18 år: 7,5 - 15 mg x 1, ges till natten

ÖVRIG INFORMATION

Risk för viktökning. Därför ska vikten följas och patienten bör få kostråd.

Med hänsyn till suicidrisk, framför allt i början av behandlingen, bör endast en begränsad mängd mirtazapin förskrivas.





Mirtazapin oralt

(ex Mirtin) tabletter

REFERENS/LÄNK

Bok Lundgren C., FAS UT 3

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Svenska Föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, SFBUP - Riktlinje Depression, 2014

<http://www.sfbup.se/vardprogram/depression/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2019-03-04

ePedID: 4797

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-04-17

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-04-17

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT