



Sertralin oralt

(ex Zoloft) tabletter

Risk för nyttillkommen suicidalitet när antidepressiva läkemedel ges till unga.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tabletter 25, 50 och 100 mg (ex Zoloft).

För doser under 25 mg, överväg oral lösning, se annan instruktion.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: Tablett 25 mg saknar brystskåra och bör därför inte delas. De flesta tabletter på 50 och 100 mg har en brytskåra som möjliggör att tablettens kan delas i två lika stora delar/doser. Dock kan det skilja sig mellan olika tillverkare, se FASS.

Enteralt i sond: Använd i första hand oral lösning, se annan instruktion.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Sertralin (ex Zoloft) (registrerad produkt)

25 mg, Filmdragerad tablett

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 30 °C. Gäller även styrkorna 50 och 100 mg.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Behandling ska inledas och övervakas av specialist.

Ångest och tvångssyndrom

Strukturerad psykopedagogisk behandling rekommenderas i första hand.

Startdos

Barn 6 - 12 år: 12,5 - 25 mg x 1

Barn 13 - 18 år: 25 - 50 mg x 1

Upptitrering

Barn 6 - 12 år: Öka dosen veckovis med 12,5 - 25 mg/dygn

Barn 13 - 18 år: Öka dosen veckovis med 25 - 50 mg/dygn

Måldos

Ångestsyndrom 50 - 150 mg x 1, max 200 mg

Tvångssyndrom 75 - 200 mg x 1, max 200 mg

Utsättning

Planeras efter remission och efter ett skolår med bra funktion.

Trappa gradvis ut dosen under 8 - 10 veckor.





Sertralin oralt

(ex Zoloft) tabletter

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Depression, medelsvår till svår

Strukturerad psykopedagogisk behandling rekommenderas i första hand.

Startdos

Barn 6 - 12 år: 12,5 - 25 mg x 1

Barn 13 - 18 år: 25 - 50 mg x 1

Upptitrering

Barn 6 - 12 år: Öka dosen veckovis med 12,5 - 25 mg/dygn

Barn 13 - 18 år: Öka dosen veckovis med 25 - 50 mg/dygn

Måldos

Barn 6 - 18 år: 50 - 100 mg x 1, max 200 mg

Utsättning

Planeras efter remission och efter ett skolår med bra funktion.

Trappa gradvis ut dosen under 8 - 10 veckor.

ÖVRIG INFORMATION

Försiktighet vid behandling av patienter med andra riskfaktorer för förlängning av QT-intervallet eller för andra hjärtsjukdomar.

Hypokalemi och hypomagnesemi ökar risken för maligna arytmier.

Vanliga biverkningar är exempelvis insomni, ångest, minskad sexlust, minskad aptit, illamående, diarré, muntorrhet.



Sertralin oralt (ex Zoloft) tabletter



REFERENS/LÄNK

Bok Lundgren C., FAS UT 3

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Svenska Föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, SFBUP - Riktlinje Depression, 2014

<http://www.sfbup.se/vardprogram/depression/>

Internetadress Svenska Föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, SFBUP - Riktlinje ångest- och tvångssyndrom, 2018

<http://www.sfbup.se/vardprogram/sfbups-riktlinjer-for-angest-och-tvangssyndrom/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna

<https://lv.se/depression-angest>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2019-03-04

ePedID: 4798

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-03-27

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-03-27

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT