



Sertralin oralt

(ex Zoloft) tabletter

Risk för nyttillkommen suicidalitet när antidepressiva läkemedel ges till barn.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tabletter 25, 50 och 100 mg (ex Zoloft).

Sertralin finns även som koncentrat till oral lösning, se annan instruktion.

ADMINISTRERING

Oralt: Tablett 25 mg saknar brytskåra och bör därför inte delas. De flesta tabletter på 50 och 100 mg har en brytskåra som möjliggör att tablettens kan delas i två lika stora delar/doser. Dock kan det skilja sig mellan olika tillverkare, se produktresumé.

Enteralt: Använd i första hand oral lösning, se annan instruktion.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Sertralin (ex Zoloft) (registrerad produkt)

Filmdragerad tablett

Förvaras vid högst 30 °C. Gäller alla styrkor.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Behandling ska skötas av specialist inom barn- och ungdomspsykiatri.

För doser under 25 mg, överväg oral lösning, se annan instruktion.

Ångest och tvångssyndrom

Strukturerad psykopedagogisk behandling rekommenderas i första hand.

Startdos

Barn 6 - 12 år: 12,5 - 25 mg x 1

Barn 13 - 18 år: 25 - 50 mg x 1

Upptitrering

Barn 6 - 12 år: Öka dosen veckovis med 12,5 - 25 mg/dygn

Barn 13 - 18 år: Öka dosen veckovis med 25 - 50 mg/dygn

Måldos

Ångestsyndrom 50 - 150 mg x 1, max 200 mg

Tvångssyndrom 75 - 200 mg x 1, max 200 mg

Utsättning

Planeras efter remission och vid ett stabilt livsskede, april och maj kan vara lämpliga månader.

Trappa gradvis ut dosen under 8 - 10 veckor.





Sertralin oralt

(ex Zoloft) tabletter

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Depression, medelsvår till svår

Strukturerad psykopedagogisk behandling rekommenderas i första hand.

Startdos

Barn 6 - 12 år: 12,5 - 25 mg x 1

Barn 13 - 18 år: 25 - 50 mg x 1

Upptitrering

Barn 6 - 12 år: Öka dosen veckovis med 12,5 - 25 mg/dygn

Barn 13 - 18 år: Öka dosen veckovis med 25 - 50 mg/dygn

Måldos

Barn 6 - 18 år: 50 - 100 mg x 1, max 200 mg

Utsättning

Planeras efter remission och vid ett stabilt livsskede, april och maj kan vara lämpliga månader.

Trappa gradvis ut dosen under 8 - 10 veckor.

ÖVRIG INFORMATION

Försiktighet vid behandling av patienter med andra riskfaktorer för förlängning av QT-intervallet eller för andra hjärtsjukdomar.

Hypokalemi och hypomagnesemi ökar risken för maligna arytmier.

Sertralin, andra SSRI-preparat och serotonin-noradrenalin-återupptagshämmare (SNRI) ger en ökad risk för blödning, inklusive gastrointestinala blödningar.

Vanliga biverkningar är exempelvis insomni, ångest, minskad sexlust, minskad aptit, illamående, diarré och muntorrhet.





Sertralin oralt (ex Zoloft) tabletter

REFERENS/LÄNK

Bok Lundgren C., FAS UT 3

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Svenska Föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, SFBUP - Riktlinje Depression, 2014

<http://www.sfbup.se/vardprogram/depression/>

Internetadress Svenska Föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, SFBUP - Riktlinje ångest- och tvångssyndrom, 2018

<http://www.sfbup.se/vardprogram/sfbups-riktlinjer-for-angest-och-tvangssyndrom/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna

<https://lv.se/depression-angest>

Micromedex

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi

ePedID: 4798

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2022-06-29

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT