



Vätsketerapi: Chock

(ex Ringer-Acetate, Plasmalyte, Natriumklorid 9 mg/mL)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

A. Balanserade lösningar utan glukos, t ex.

1A. Ringer-Acetate

2A. Plasmalyte

B. Vid upprepade kräkningar med alkalos eller vid hypertont dehydrering är Natriumklorid 9 mg/mL att föredra.

ADMINISTRERING

Intravenös injektion/infusion: 10 - 20 min

Kan administreras via perifer eller central venkateter eller via intraosseös infart.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Natriumklorid 9 mg/mL INF (registrerad produkt)

Infusionsvätska, lösning

Efter iordningställande: 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur. Alternativt kan infusion pågå 24 tim efter iordningställande om bedömning eller utvärdering utförts enligt Svensk läkemedelsstandard, se referens Hållbarhetsinformation.

Plasmalyte (registrerad produkt)

Infusionsvätska, lösning

Efter iordningställande: 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur. Alternativt kan infusion pågå 24 tim efter iordningställande om bedömning eller utvärdering utförts enligt Svensk läkemedelsstandard, se referens Hållbarhetsinformation.

Ringer-Acetate (registrerad produkt)

Infusionsvätska, lösning

Efter iordningställande: 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur. Alternativt kan infusion pågå 24 tim efter iordningställande om bedömning eller utvärdering utförts enligt Svensk läkemedelsstandard, se referens Hållbarhetsinformation.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Chock

Nyfödda: 10 mL/kg

Barn 1 mån - 18 år: 10 mL/kg

Vid behov kan behandlingen upprepas.

ÖVRIG INFORMATION

Vid behov av upprepade doser kan användning av Albumin 5 % övervägas.

Specificerat innehåll (mmol/L, * % glukos)

# Preparat	Natrium	Kalium	Klorid	Acetat	Gluconat	Glukos*
1A. Ringer-Acetate	130	4	110	30	0	0
2A. Plasmalyte	140	5	98	27	23	0
B. NaCl 9 mg/mL	154	0	154	0	0	0

REFERENS/LÄNK

Internetadress ePed - Hållbarhetsinformation

<http://eped.se/hallbarhet/>

Internetadress HLR-rådet - Avancerad hjärt-lungräddning Barn, Handlungsplan

<https://hlrwebbutik.se/produkt-kategori/barn-a-hlr/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Intravenös vätskebehandling till barn

<https://lv.se/ivvatskabarn>

Rekommendation , (Grade 1B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 4805

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2022-02-08

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT