



Vätsketerapi: Snabb uppvätskning

(ex Ringer Acetat, Plasmalyte, Glukos buffrad 25 mg/mL med tillsatser)

Identifiera patienter med påslag av ADH (Antidiuretiskt hormon)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Beredningsinstruktion:

A. Balanserade lösningar med glukos 0 - 1 % och Na 130 - 154 mmol/L, t.ex.:

1A. Ringer Acetat

2A. Plasmalyte

B. Vid hypoglykemi:

Glukos buffrad 25 mg/mL med extra tillsats av Na (70 mmol/L) till totalt 140 mmol/L:

1B. Tillsats av 70 mmol Na/L enligt nedan i 1000 mL

2B. Tillsats av 70 mmol Na/L enligt nedan i 500 mL

Tillsatser som ger Vätsketerapi: Snabb uppvätskning till Na 140 mmol/L

Alternativ för tillsats:	1 B	2 B
Glukos buffrad 25 mg/mL IV	1000 mL	500 mL
Addens/Addex-Natriumklorid 4 mmol/mL I	17,5 mL	8,75 mL

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös infusion: 4 tim

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Måttlig till svår dehydrering

5 % av kroppsvikten = 12,5 mL/kg/tim.

Lathund (rimlig mängd vätska mL/tim)

3 kg 37,5 mL/tim 150 mL/4h

5 kg 62,5 mL/tim 250 mL/4h

20 kg 250 mL/tim 1000 mL/4h

50 kg 625 mL/tim 2500 mL/4h

Vid behov kan behandlingen upprepas.

REFERENS/LÄNK

Internetadress ePed - Hållbarhetsinformation

<http://eped.se/hallbarhet/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Intravenös vätskebehandling till barn

<https://lv.se/ivvatskabarn>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2018-12-19

ePedID: 4806

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-12-19

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-12-19

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT





Vätsketerapi: Snabb uppvätskning

(ex Ringer Acetat, Plasmalyte, Glukos buffrad 25 mg/mL med tillsatser)

ÖVRIG INFORMATION

Kontrollera P-Na och P-K minst en gång före och efter infusionen.

När den snabba uppvätskningen är avslutad rekommenderas långsam rehydrering (se instruktionen för vätsketerapi vid underhållsbehandling).

Specificerat innehåll (mmol/L, *gram glukos/L)

#	Preparat	Natrium	Kalium	Klorid	Glukos*	Acetat	Gluconat
1A.	Ringer-Acetat	130	4	110	0	30	0
2A.	Plasmalyte	140	5	98	0	27	23
1B,2B.	Buffrad glukos 25 mg/mL	140	0	115	25	25	0

+tillsats: 70 mmol Na/L





Vätsketerapi: Snabb uppvätskning

(ex Ringer Acetat, Plasmalyte, Glukos buffrad 25 mg/mL med tillsatser)

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Addens/Addex-Natriumklorid (registrerad produkt)

4 mmol/mL, Koncentrat till infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Öppnad förpackning bör förvaras åtskild från andra elektrolytlösningar för att undvika förväxling. Öppnad förpackning får ej sparas pga förväxlingsrisk.

Glukos buffrad (registrerad produkt)

25 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Efter iordningställande: 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur. Alternativt kan infusion pågå 24 tim efter iordningställande om bedömning eller utvärdering utförts enligt Svensk läkemedelsstandard, se referens Hållbarhetsinformation.

Plasmalyte (registrerad produkt)

Infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Efter iordningställande: 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur. Alternativt kan infusion pågå 24 tim efter iordningställande om bedömning eller utvärdering utförts enligt Svensk läkemedelsstandard, se referens Hållbarhetsinformation.

Ringer-Acetate (registrerad produkt)

Infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Efter iordningställande: 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur. Alternativt kan infusion pågå 24 tim efter iordningställande om bedömning eller utvärdering utförts enligt Svensk läkemedelsstandard, se referens Hållbarhetsinformation.