



Aciklovir oralt 40 mg/mL

(Zovirax) oral suspension

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Färdigberedd oral suspension 40 mg/mL (Zovirax)

För dos 800 mg rekommenderas i första hand tablett eller oral suspension 80 mg/mL, se andra instruktioner.

ADMINISTRERING

Omskakas innan varje administrering.

Oralt

Enteralt:

Mycket viskös suspension som kan vara svår att ge framför allt i de tunnaste infarterna.

Innehåller sorbitol som kan ge diarré och andra gastrointestinala komplikationer.

RIMLIG DOS för Aciklovir oralt 40 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
7,5 mg/kg	-	0,94 mL	1,88 mL	-
20 mg/kg	-	2,5 mL	5 mL	-
max 800 mg	-	-	-	20 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Aciklovir (registrerad produkt)

40 mg/mL, Oral suspension

Förvaras i rumstemperatur. För infektiöskänslig patient hållbar 1 mån efter första uttag, för övriga 6 mån.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Viktigt med adekvat hydrering, särskilt vid behandling med höga doser.

VZV = varicella zostervirus HSV = herpes simplexvirus

HSV-infektion, behandling

Barn 1 - 23 mån: 100 mg x 5 (2,5 mL x 5)

Barn 2 - 18 år: 200 mg x 5 (5 mL x 5)

Första dosen bör tas så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet. Doserna ges var 4:e timme under den vakna delen av dygnet.

Behandlingstid: 5 - 10 dagar beroende på svårighetsgrad

HSV-infektion, profylax till patienter med nedsatt immunförsvar

Barn 1 - 23 mån: 100 - 200 mg x 4 (2,5 - 5 mL x 4)

Barn 2 - 18 år: 200 - 400 mg x 4 (5 - 10 mL x 4)

Dosen ges var 5:e timme under den vakna delen av dygnet.

Vid långtidsbehandling, vanligen 12 mån, ges lägre dos:

Barn under 40 kg: 7,5 mg/kg x 2

Barn från 40 kg: 400 mg x 2 (10 mL x 2)

VZV-infektion (vattkoppor/bältros)

Nyfödda, fullgångna: 20 mg/kg x 4

Barn 1 mån - 12 år: 20 mg/kg x 4, max 800 mg x 4

Dosen ges var 5:e timme den vakna delen av dygnet.

Barn 13 - 18 år: 800 mg x 5 (20 mL x 5)

Dosen ges var 4:e timme den vakna delen av dygnet.

Vattkoppor: behandling ska sättas in inom 24 tim från blåsdebut.

Bältros: behandling ska sättas in snarast, senast inom 72 tim från blåsdebut.

Behandlingstid: vanligen 5 - 7 dagar, men minst till 2 dagar efter att det har bildats krustor av blåsorna.



Aciklovir oralt 40 mg/mL (Zovirax) oral suspension



VANLIG INDIKATION OCH DOS

Akut perifer facialis pares med samtidig VZV-reaktivering

Behandling med aciklovir sätts in vid påvisat VZV-DNA i likvor, blåsskrap eller spottkörtelsekret.

Barn 3 mån - 12 år: 20 mg/kg x 4, max 800 mg x 4
Dosen ges var 5:e timme den vakna delen av dygnet.

Barn 13 - 18 år: 800 mg x 5 (20 mL x 5)
Dosen ges var 4:e timme den vakna delen av dygnet.

Behandlingstid: 7 dagar

ÖVRIG INFORMATION

Behandling av Varicella zoster/Herpes zoster hos patienter med normalt immunförsvar ska initieras om ett allvarligt sjukdomsförlopp kan befaras.

Aciklovir absorberas ofullständigt från gastrointestinalkanalen. Absorptionen sjunker med stigande doser och ligger mellan ca 9 - 20 %.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress RAV, Referensgruppen för antiviral terapi - Farmakoterapi vid herpes simplex-, varicella- och herpes zosterinfektioner

<https://www.sls.se/rav/rekommendationer/herpes-simplex-och-varicella-zoster-virus/>

Internetadress Vårdgivarguiden Region Stockholm - Regionalt vårdprogram, Akut perifer facialis pares hos barn och unga 2019

https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardprogram/rvp_akut-facialis-pares_190627.pdf

Rekommendation , (Grade 1C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade



Aciklovir oralt 40 mg/mL (Zovirax) oral suspension



LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4809

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 4809

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2022-03-01

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT