



## Aciklovir oralt 80 mg/mL

(Zovirax) oral suspension

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Färdigberedd oral suspension Zovirax 80 mg/mL

Aciklovir finns även som oral suspension 40 mg/mL samt tablett, se andra instruktioner.

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Omskakas innan varje administrering.

Oralt

Enteralt i sond:

Mycket viskös suspension, bör inte ges i sond.

### ÖVRIG INFORMATION

Behandling av herpes zoster hos patienter med normalt immunförsvar ska initieras om ett allvarligt sjukdomsförlopp kan befaras.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Aciklovir (registrerad produkt)

80 mg/mL, Oral suspension

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. För infektiöskänslig patient hållbar 1 mån efter första uttag, för övriga enligt förpackningen.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

Viktigt med adekvat hydrering, särskilt vid behandling med höga doser.

#### Herpes simplex, behandling

Barn 1 - 23 mån: 100 mg x 5 (1,25 mL x 5)

Barn 2 - 18 år: 200 mg x 5 (2,5 mL x 5)

Första dosen bör tas så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet. Dosererna ges var 4:e timme under den vakna delen av dygnet.

Behandlingstid: 5 - 10 dagar beroende på svårighetsgrad

#### Herpes simplex, profylax till patienter med nedsatt immunförsvar

Barn 1- 23 mån: 100 - 200 mg x 4 (1,25 - 2,5 mL x 4)

Barn 2 - 18 år: 200 - 400 mg x 4 (2,5 - 5 mL x 4)

Dosen ges var 5:e timme under den vakna delen av dygnet.

#### Varicella zoster/Herpes zoster (vattkoppor, bältros)

Nyfödda, fullgångna: 20 mg/kg x 4

Barn 1 mån - 12 år: 20 mg/kg x 4, max 800 mg x 4

Dosen ges var 5:e timme den vakna delen av dygnet.

Barn 12 - 18 år: 800 mg x 5 (10 mL x 5)

Dosen ges var 4:e timme den vakna delen av dygnet.

Varicella zoster: behandling ska sättas in inom 24 tim från blåsdebut.

Herpes zoster: behandling ska sättas in snarast, senast inom 72 tim från blåsdebut.

Behandlingstid: vanligen 5 - 7 dagar, men minst till 2 dagar efter att det har bildats krustor av blåsorna.

### RIMLIG DOS FÖR 80 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
20 mg/kg	-	1,25 mL	2,5 mL	10 mL



## Aciklovir oralt 80 mg/mL

(Zovirax) oral suspension



### REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Farmakoterapi vid herpes simplex-, varicella- och herpes zosterinfektioner

<https://lv.se/herpes>

Rekommendation , (Grade 1C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

### LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#4810](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4810)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2018-12-18

ePedID: 4810

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2018-12-19

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2018-12-19

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**