



Aciklovir oralt 80 mg/mL

(Zovirax) oral suspension

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Färdigberedd oral suspension Zovirax 80 mg/mL

Aciklovir finns även som oral suspension 40 mg/mL samt tablett, se andra instruktioner.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Omskakas innan varje administrering.

Oralt

Enteralt i sond:

Mycket viskös suspension som kan vara svår att ge framför allt i de tunnaste sonderna.

Innehåller sorbitol som kan ge diarré och andra gastrointestinala komplikationer.

RIMLIG DOS FÖR 80 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
7,5 mg/kg	-	0,47 mL	0,94 mL	-
20 mg/kg	-	1,25 mL	2,5 mL	-
max 800 mg	-	-	-	10 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Aciklovir (registrerad produkt)

80 mg/mL, Oral suspension

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. För infektiöskänslig patient hållbar 1 mån efter första uttag, för övriga enligt förpackningen.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Viktigt med adekvat hydrering, särskilt vid behandling med höga doser.

Herpes simplex, behandling

Barn 1 - 23 mån: 100 mg x 5 (1,25 mL x 5)

Barn 2 - 18 år: 200 mg x 5 (2,5 mL x 5)

Första dosen bör tas så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet. Doserna ges var 4:e timme under den vakna delen av dygnet.

Behandlingstid: 5 - 10 dagar beroende på svårighetsgrad

Herpes simplex, profylax till patienter med nedsatt immunförsvar

Barn 1 - 23 mån: 100 - 200 mg x 4 (1,25 - 2,5 mL x 4)

Barn 2 - 18 år: 200 - 400 mg x 4 (2,5 - 5 mL x 4)

Dosen ges var 5:e timme under den vakna delen av dygnet.

Vid långtidsbehandling, vanligen 12 mån, i samband med stamscellstransplantation ges lägre dos:

Barn under 40 kg: 7,5 mg/kg x 2

Barn från 40 kg: 400 mg x 2 (5 mL x 2)

Varicella zoster/Herpes zoster (vattkoppor, bältros)

Nyfödda, fullgångna: 20 mg/kg x 4

Barn 1 mån - 12 år: 20 mg/kg x 4, max 800 mg x 4

Dosen ges var 5:e timme den vakna delen av dygnet.

Barn 12 - 18 år: 800 mg x 5 (10 mL x 5)

Dosen ges var 4:e timme den vakna delen av dygnet.

Varicella zoster: behandling ska sättas in inom 24 tim från blåsdebut.

Herpes zoster: behandling ska sättas in snarast, senast inom 72 tim från blåsdebut.

Behandlingstid: vanligen 5 - 7 dagar, men minst till 2 dagar efter att det har bildats krutor av blåsorna.



Aciklovir oralt 80 mg/mL (Zovirax) oral suspension



ÖVRIG INFORMATION

Behandling av herpes zoster hos patienter med normalt immunförsvar ska initieras om ett allvarligt sjukdomsförlopp kan befaras.

Aciklovir absorberas ofullständigt från gastrointestinalkanalen. Absorptionen sjunker med stigande doser och ligger mellan ca 9 - 20 %.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Farmakoterapi vid herpes simplex-, varicella- och herpes zosterinfektioner

<https://lv.se/herpes>

Rekommendation , (Grade 1C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4810

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2019-01-13

ePedID: 4810

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-01-16

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-01-16

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT