



Varicella Zoster-immunglobulin intramuskulär inj 104 E/mL

(Varizig licens)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Humant Varicella Zoster-immunglobulin, ska ej spädas

Injektionsflaska 1,2 mL innehåller 125 E

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intramuskulär injektion:

Låt lösningen anta rumstemperatur innan administrering.

Barn under 1 år: Ges i mellersta delen av lårets utsida (anterolaterala delen).

Barn från 1 år: Ges i övre tredjedelen av överarmens utsida (i deltoideusmuskeln).

Dosen kan behöva delas upp på två eller flera injektionsställen, max 3 mL per ställe.

Överkänslighetsreaktion kan förekomma. Patienten ska därför övervakas under och minst 20 min efter administreringen.

Biologiskt läkemedel. Enligt författning HSLF-FS 2017:37 ange batchnummer i journalhandling.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Varizig (licensprodukt)

104 E/mL, Injektionsvätska, intramuskulär

HÅLLBAR: Förvaras i kylskåp. Får ej frysas. Öppnad flaska används direkt, får ej sparas.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Post-expositionsprofylax för högriskpatienter

Dosen ges som engångsdos så snart som möjligt, helst inom 96 tim, men inte senare än 10 dagar efter exponeringen.

Nyfödda, upp till 2 kg:	62,5 E	(0,6 mL)
Nyfödda, barn 2,1 - 10 kg:	125 E	(1,2 mL)
Barn 10,1 - 20 kg:	250 E	(2,4 mL)
Barn 20,1 - 30 kg:	375 E	(3,6 mL)
Barn 30,1 - 40 kg:	500 E	(4,8 mL)
Barn över 40 kg:	625 E	(6,0 mL)

En andra dos kan övervägas till patienter som har exponerats ytterligare en eller flera gånger för varicella när mer än 3 veckor förflutit efter den första dosen.

ÖVRIG INFORMATION

Observera att det finns olika licenspreparat med Varicella Zoster-immunglobulin.

Dessa har olika dosering och därför kan doseringar i litteratur/källor också skilja sig åt.

REFERENS/LÄNK

Internetadress RAV, Referensgruppen för antiviral terapi - Farmakoterapi vid herpes simplex-, varicella- och herpes zosterinfektioner

<https://www.sls.se/rav/rekommendationer/herpes-simplex-och-varicella-zoster-virus/>

PubMed PMID Lachiewicz A M et al. Varicella-zoster virus post-exposure management and prophylaxis: A review

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31890472>

PubMed PMID Marin M et al. Updated recommendations for use of VariZIG - United States, 2013

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23863705>

Rekommendation (Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Summary of Product Characteristics (SPC) Varizig injektionslösning 125 E





Varicella Zoster-immunglobulin intramuskulär inj 104 E/mL

(Varizig licens)

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2020-08-14

ePedID: 4811

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-08-18

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-08-18

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT