



Etanercept subkutan inj

(ex Enbrel, Benepali) förfylld spruta/injektionspenna

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Referensläkemedel:

Enbrel

Förfyllda sprutor 25 och 50 mg

Förfylld injektionspenna 50 mg

Biosimilarer:

Benepali

Förfyllda sprutor 25 och 50 mg

Förfylld injektionspenna 50 mg

Erelzi

Förfylld spruta 50 mg

Förfylld injektionspenna 50 mg

Vid behov av andra doser, se annan instruktion.

ADMINISTRERING

Subkutan injektion: Injektionen kan göra mindre ont om lösningen är rumstempererad (tar ca 15 - 30 min). Ta inte av nålskyddet på sprutan förrän precis innan administrering.

Biologiskt läkemedel. Enligt författning HSLF-FS 2017:37 ange batchnummer i journalhandling.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Enbrel (registrerad produkt)

25 mg, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta

Förvaras i kylskåp, i ytterförpackningen, får inte frysas. Ljuskänsligt. Vid behov kan den förfyllda sprutan förvaras vid max 25 °C och användas inom 4 veckor. Gäller alla tillverkare och styrkor.

50 mg, Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna

Förvaras i kylskåp, i ytterförpackningen, får inte frysas. Ljuskänsligt. Vid behov kan pennan förvaras vid max 25 °C och användas inom 4 veckor. Gäller alla tillverkare.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Juvenil idiopatisk artrit (JIA)

Barn 2 - 18 år:

Alt 1: 0,8 mg/kg ges 1 gång/VECKA, max 50 mg/DOS

Alt 2: 0,4 mg/kg ges 2 gånger/VECKA, max 25 mg/DOS

Flertalet patienter svarar bra på en dos i veckan men det finns individer som har bättre effekt med två doser i veckan, administrerad med 3 - 4 dagars mellanrum.

Max 50 mg/VECKA, gäller båda alternativen.

Plackpsoriasis

Barn 6 - 18 år: 0,8 mg/kg ges 1 gång/VECKA, max 50 mg/DOS,
max 50 mg/VECKA

Behandlingstid: Upp till 24 veckor.

Om ingen effekt ses efter 12 veckor ska behandlingen avbrytas.

ÖVRIG INFORMATION

För kontroll av behandlingseffekt bör följande prover tas: SR/CRP, blodstatus, ALAT, kreatinin, u-sticka.

Enligt produktresumé och Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation rekommenderas användning av etanercept på barn med plackpsoriasis från 6 års ålder. Det finns dock studier på barn från 4 års ålder, se Referens.





Etanercept subkutan inj

(ex Enbrel, Benepali) förfylld spruta/injektionspenna

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendation, Läkemedel vid psoriasis och psoriasisartrit - behandlings-rekommendation

<https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/sok-behandlingsrekommendationer/lakemedel-vid-psoriasis-och-psoriasisartrit---behandlingsrekommendation>

Micromedex

PubMed PMID Paller A S et al. Etanercept treatment for children and adolescents with plaque psoriasis

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18199863/>

PubMed PMID Paller A S et al. Long-term safety and efficacy of etanercept in children and adolescents with plaque psoriasis.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26775775/>

PubMed PMID S Takei et al. Safety and efficacy of high dose etanercept in treatment of juvenile rheumatoid arthritis

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11469478/>

PubMed PMID Siegfried et al. Intermittent etanercept therapy in pediatric patients with psoriasis

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20833444>

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnreumatologisk Förening - Farmakologiska behandlingsrutiner för JIA

<https://reuma.barnlakarforeningen.se/varprogram/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi

ePedID: 4813

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2023-09-13

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT