



## Etanercept subkutan inj

(ex Enbrel, Benepali) förfyllda sprutor/injektionspenna

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Referensläkemedel:

Enbrel

Förfyllda sprutor 25 och 50 mg

Förfylld injektionspenna 50 mg

Biosimilarer:

Benepali

Förfyllda sprutor 25 och 50 mg

Förfylld injektionspenna 50 mg

Erelzi

Förfylld spruta 50 mg

Förfylld injektionspenna 50 mg

Vid behov av andra doser, se annan instruktion.

### ADMINISTRERING

Subkutan injektion: Injektionen kan göra mindre ont om lösningen är rumstempererad (tar ca 15 - 30 min). Ta inte av nålskyddet på sprutan förrän precis innan administrering.

Biologiskt läkemedel. Enligt författning HSLF-FS 2017:37 ange batchnummer i journalhandling.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Enbrel (registrerad produkt)

25 mg, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta

Förvaras i kylskåp, i ytterförpackningen, får inte frysas. Ljuskänsligt. Vid behov kan den förfyllda sprutan förvaras vid max 25 °C och användas inom 4 veckor. Gäller alla tillverkare och styrkor.

50 mg, Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna

Förvaras i kylskåp, i ytterförpackningen, får inte frysas. Ljuskänsligt. Vid behov kan pennan förvaras vid max 25 °C och användas inom 4 veckor. Gäller alla tillverkare.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Juvenil idiopatisk artrit (JIA)

Barn 2 - 18 år:

Alt 1: 0,8 mg/kg ges 1 gång/VECKA, max 50 mg/DOS

Alt 2: 0,4 mg/kg ges 2 gånger/VECKA, max 25 mg/DOS

Flertalet patienter svarar bra på en dos i veckan men det finns individer som har bättre effekt med två doser i veckan, administrerad med 3 - 4 dagars mellanrum.

Max 50 mg/VECKA, gäller båda alternativen.

#### Plackpsoriasis

Barn 6 - 18 år: 0,8 mg/kg ges 1 gång/VECKA, max 50 mg/DOS,  
max 50 mg/VECKA

Behandlingstid: Upp till 24 veckor.

Om ingen effekt ses efter 12 veckor ska behandlingen avbrytas.

### ÖVRIG INFORMATION

För kontroll av behandlingseffekt bör följande prover tas: SR/CRP, blodstatus, ALAT, kreatinin, u-sticka.

Enligt produktresumé och Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation rekommenderas användning av etanercept på barn med plackpsoriasis från 6 års ålder. Det finns dock studier på barn från 4 års ålder, se Referens.





## Etanercept subkutan inj

(ex Enbrel, Benepali) förfyllda sprutor/injektionspenna

### REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendation, Läkemedel vid psoriasis och psoriasisartrit - behandlings-rekommendation

<https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/sok-behandlingsrekommendationer/lakemedel-vid-psoriasis-och-psoriasisartrit---behandlingsrekommendation>

Micromedex

PubMed PMID Paller A S et al. Etanercept treatment for children and adolescents with plaque psoriasis

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18199863/>

PubMed PMID Paller A S et al. Long-term safety and efficacy of etanercept in children and adolescents with plaque psoriasis.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26775775/>

PubMed PMID S Takei et al. Safety and efficacy of high dose etanercept in treatment of juvenile rheumatoid arthritis

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11469478/>

PubMed PMID Siegfried et al. Intermittent etanercept therapy in pediatric patients with psoriasis

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20833444>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnreumatologisk Förening - Farmakologiska behandlingsrutiner för JIA

<https://reuma.barnlakarforeningen.se/varprogram/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi

ePedID: 4813

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2023-09-25

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**