



# Cefadroxil oralt 100 mg/mL

oral suspension

## INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Alt. 1: Färdigspädd oral suspension 100 mg/mL (Cefadroxil Mylan)  
Alt. 2 - 3: Pulver till oral suspension 100 mg/mL, späds på vårdenhet

OBS! Rutin för hantering av orala antibiotikapulver ska finnas för vårdenheten om alt 2 - 3 används.

## EN-STEGSSPÄDNING

### Alt. 2 Pulver till slutvolym 60 mL

Cefadroxil		Sterilt Vatten		ORAL SUSP
60 mL				100 mg/mL
	+		=	
1 st		30 mL		60 mL

## EN-STEGSSPÄDNING

### Alt. 3 Pulver till slutvolym 100 mL

Cefadroxil		Sterilt Vatten		ORAL SUSP
100 mL				100 mg/mL
	+		=	
1 st		50 mL		100 mL

### Beredningsinstruktion:

Pulvret bidrar med volym, därför blir slutvolymen betydligt större än den tillsatta volymen sterilt vatten.

## ARBETSMILJÖ

Allergisk, hantera enligt lokal rutin, cefalosporiner kan vid inandning och hudkontakt ge allergiska reaktioner.

## ADMINISTRERINGSSÄTT

Skaka flaskan väl innan varje administrering. Cefadroxil bör tas tillsammans med mat.

Oralt

Enteralt i sond

## VANLIG INDIKATION OCH DOS

Cefadroxil ska användas restriktivt för att minska risken för selektion av ESBL-producerande bakterier.

### Afebril urinvägsinfektion

Behandlingen påbörjas innan resistensbesked finns.

Barn över 2 år: 12,5 mg/kg x 2, max 500 mg/dos

Behandlingstid: 5 dagar

### Recidiv av streptokocktonsillit

Barn 1 mån - 18 år: 15 mg/kg x 2, max 500 mg/dos

Behandlingstid: 10 dagar

### Sårinfektion inkl. utbredd impetigo (2:a handsval)

Barn 1 mån - 18 år: 15 mg/kg x 2, max 500 mg/dos

Behandlingstid: 7 dagar

## REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/behandlingsrekommendationer-for-vanliga-infektioner-i-oppenvard/>

Internetadress Kloka Listan

<http://klokalistan2.janusinfo.se/20201/Infektioner/>

Micromedex

Rekommendation (Grade 1C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)





## Cefadroxil oralt 100 mg/mL

oral suspension

### RIMLIG DOS för Cefadroxil oralt 100 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
12,5 mg/kg	-	0,62 mL	1,25 mL	-
15 mg/kg	-	0,75 mL	1,5 mL	-
max 500 mg	-	-	-	5 mL

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Cefadroxil (registrerad produkt)

100 mg/mL, Oral suspension

HÅLLBAR: Efter beredning hållbar 14 dagar i kylskåp.

60 mL, Pulver till oral suspension

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur i ytterkartongen, ljuskänsligt. Gäller båda flaskstorlekarna.

### LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#4821](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4821)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2020-03-11

ePedID: 4821

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-03-11

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2020-03-11

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**